



<i>Rodzaj dokumentu:</i>	<b>Osiągnięcia uczniów kończących VIII klasę szkoły podstawowej. Sprawozdanie za rok 2024</b>
<i>Egzamin:</i>	<b>Egzamin ósmoklasisty</b>
<i>Przedmiot:</i>	<b>Matematyka</b>
<i>Termin egzaminu:</i>	15 maja 2024 r.
<i>Data publikacji dokumentu:</i>	20 września 2024 r.

## Opracowanie

Monika Nowak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)  
Grażyna Miłkowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)  
Anna Malinowska (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu)  
Iwona Łuba (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży)  
Ewa Liwska (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie)

### OPIEKA MERYTORYCZNA:

Mariusz Mroczek (Centralna Komisja Egzaminacyjna)  
dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

### OPRACOWANIE TECHNICZNE:

Andrzej Kaptur (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

### WSPÓŁPRACA

Agata Wiśniewska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)  
Beata Dobrosielska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)  
Pracownie ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych

### **OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE**

01-233 WARSZAWA ul. Józefa Bema 87

tel. (22) 457-03-35

<http://www.oke.waw.pl> e-mail [info@oke.waw.pl](mailto:info@oke.waw.pl)

## Spis treści

1. Opis arkusza standardowego .....	5
2. Dane dotyczące populacji uczniów .....	5
3. Przebieg egzaminu .....	7
4. Podstawowe dane statystyczne .....	8
Komentarz .....	18
Podstawowe informacje o arkuszach dostosowanych .....	64



## 1. Opis arkusza standardowego

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty z matematyki został przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty<sup>1</sup>.

Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OMAP-100-2405. Arkusz egzaminacyjny zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz, zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

## 2. Dane dotyczące populacji uczniów

TABELA 1. UCZNIOWIE ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM

Liczba uczniów		32 527
Uczniowie	bez dysleksji rozwojowej	24 535
	z dysleksją rozwojową	7 992
	dziewczęta	15 718
	chłopcy	16 809
	ze szkół na wsi	10 670
	ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców	4 078
	ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców	4 950
	ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców	12 829
	ze szkół publicznych	28 003
	ze szkół niepublicznych	4 524
	rozwiązujący zadania w języku polskim	30 486
	obywatele Ukrainy <sup>2,3</sup>	2 041

Z egzaminu zwolniono 68 uczniów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1591).

<sup>2</sup> Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.

<sup>3</sup> Uczniowie – obywatele Ukrainy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty na podstawie § 2b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2024 r. poz. 1302).

TABELA 2. UCZNIOWIE ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH

Uczniowie	z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	1 534
	słabowidzący i niewidomi	88
	słabosłyszący i niesłyszący	124
	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	741
	z afazją	142
	z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym	22
	z zaburzeniem widzenia barw	11
	z niepełnosprawnościami sprzężonymi	24
	o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy <sup>4</sup> (cudzoziemcy)	1 353
	obywatele Ukrainy	11
	<b>Ogółem</b>	<b>4 050</b>

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2024 r. poz. 737, z późn. zm.).

### 3. Przebieg egzaminu

**TABELA 3.** INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

Termin egzaminu		15 maja 2024 r.	
Czas trwania egzaminu		100 minut dla uczniów rozwiązujących zadania w arkuszu standardowym lub czas przedłużony zgodnie z przyznanym dostosowaniem	
Liczba szkół		1 623	
Liczba zespołów egzaminatorów		15	
Liczba egzaminatorów		344	
Liczba obserwatorów <sup>5</sup> (§ 7 ust. 1)		186	
Liczba unieważnień <sup>6</sup>	w przypadku:		
	art. 44zzv pkt 1	stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia	0
	art. 44zzv pkt 2	wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego	0
	art. 44zzv pkt 3	zakłócenia przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty	0
	art. 44zzw ust. 1	stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia	0
	art. 44zzy ust. 7	stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty	1
	art. 44zzy ust. 10	niemożności ustalenia wyniku (np. zaginięcia karty odpowiedzi)	0
	inne (np. złe samopoczucie ucznia)		0
Liczba wglądów <sup>6</sup> (art. 44zzz ust. 1)		689	

<sup>5</sup> Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636 z późn. zm.).

<sup>6</sup> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024 r. poz. 854).

## 4. Podstawowe dane statystyczne

### Wyniki uczniów

WYKRES 1. ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW




TABELA 4. WYNIKI UCZNIÓW – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
32 527	0	100	60	100	57	30



## Wyniki uczniów w procentach, odpowiadające im wartości centyli i wyniki na skali staninowej

**TABELA 5.** WYNIKI UCZNIÓW W PROCENTACH, ODPOWIADAJĄCE IM WARTOŚCI CENTYLI I WYNIKI NA SKALI STANINOWEJ

Matematyka		
wynik procentowy	wartość centyla	stanin
0	1	1
4	2	
8	5	2
12	10	
16	16	3
20	22	
24	27	4
28	33	
32	38	
36	42	5
40	46	
44	50	
48	54	
52	57	
56	61	6
60	64	
64	67	
68	70	
72	74	
76	77	7
80	80	
84	84	
88	88	8
92	92	
96	96	9
100	100	

W tabeli 5. przedstawiono wyniki procentowe uczniów i odniesiono je do wartości centyla i odpowiadającego im stanina. Wyniki w skali centylowej i staninowej umożliwiają porównanie wyniku ucznia z wynikami uczniów w całym kraju. Na przykład, jeśli uczeń z matematyki uzyskał 76% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), to oznacza, że jego wynik jest taki sam lub wyższy od wyniku 77% wszystkich zdających (wynik centylowy), a niższy od wyniku 23% zdających i znajduje się on w 6. staninie.

Średnie wyniki szkół<sup>7</sup> na skali staninowej


TABELA 6. WYNIKI SZKÓŁ NA SKALI STANINOWEJ

Stanin	Przedział wyników (w%)
1	7–22
2	23–30
3	31–37
4	38–44
5	45–52
6	53–60
7	61–68
8	69–78
9	79–96

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach nie oznacza tego samego poziomu osiągnięć.

## Wyniki uczniów bez dysleksji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

WYKRES 2. ROZKŁADY WYNIKÓW UCZNIÓW BEZ DYSLEKSJI ORAZ UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ




<sup>7</sup> Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o wynikach szkół w 2024 roku, przez szkołę należy rozumieć każdą placówkę, w której liczba uczniów przystępujących do egzaminu była nie mniejsza niż 5. Wyniki szkół obliczono na podstawie wyników uczniów, którzy wykonywali zadania z arkusza OMAP-100-2405.

**TABELA 7.** WYNIKI UCZNIÓW BEZ DYSLEKSJI ORAZ UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ – PARAMETRY STATYSTYCZNE

	Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
Uczniowie bez dysleksji	24 535	0	100	60	100	58	30
Uczniowie z dysleksją rozwojową	7 992	0	100	56	96	57	29

### Wyniki dziewcząt i chłopców

**WYKRES 3.** ROZKŁADY WYNIKÓW DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW



**TABELA 8.** WYNIKI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Płeć	Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
Dziewczęta	15 718	0	100	60	100	57	30
Chłopcy	16 809	0	100	60	100	58	30

**Wyniki uczniów a wielkość miejscowości****TABELA 9.** WYNIKI UCZNIÓW W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI SZKOŁY – PARAMETRY STATYSTYCZNE

	<b>Liczba uczniów</b>	<b>Minimum (%)</b>	<b>Maksimum (%)</b>	<b>Mediana (%)</b>	<b>Modalna (%)</b>	<b>Średnia (%)</b>	<b>Odchylenie standardowe (%)</b>
Wieś	10 670	0	100	52	24	52	28
Miasto do 20 tys. mieszkańców	4 078	0	100	48	20	50	29
Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców	4 950	0	100	56	96	56	29
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców	12 829	0	100	72	100	64	29

**Wyniki uczniów szkół publicznych i szkół niepublicznych****TABELA 10.** WYNIKI UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH I SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE

	<b>Liczba uczniów</b>	<b>Minimum (%)</b>	<b>Maksimum (%)</b>	<b>Mediana (%)</b>	<b>Modalna (%)</b>	<b>Średnia (%)</b>	<b>Odchylenie standardowe (%)</b>
Szkoła publiczna	28 003	0	100	56	100	56	29
Szkoła niepubliczna	4 524	0	100	76	100	65	31

## Poziom wykonania zadań

TABELA 11. POZIOM WYKONANIA ZADAŃ


Wymagania egzaminacyjne 2024			
Numer zadania	Wymagania ogólne	Wymagania szczegółowe	Poziom wykonania zadania (%)
1.	II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.	XXI. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń: 1) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach za pomocą [...] diagramów słupkowych [...]. VI. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości [...]; 3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach [...].	69
2.	I. Sprawność rachunkowa. 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.	IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego.	57
3.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.	XXI. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń: 2) oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.	68
4.	I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.	IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 12) porównuje ułamki (zwykłe [...]). V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych [...].	54
5.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	XVII. Wielokąty. Uczeń: 7) oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.	70

6.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	XII. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń: 5) przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu).	51
7.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	VII. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń: 2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich; 4) podnosi potęgę do potęgi.	55
8.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.	XX. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 2) przeprowadza proste doświadczenia losowe [...] i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych.	66
9.	II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.	X. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń: 3) mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany.	71
10.	I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.	VI. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach [...].	72
11.	II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.	XIII. Proporcjonalność prosta. Uczeń: 2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej [...]. XXI. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń: 1) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, za pomocą [...] wykresów [...].	70

12.	II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.	XVIII. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Uczeń: 1) znajduje współrzędne danych [...] punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.	75
13.	IV. Rozumowanie i argumentacja. 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.	IX. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi. Uczeń: 4) stosuje oznaczenia literowe nieznanymi wielkośći liczbowych i zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych. XVI. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń: 2) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta [...].	71
14.	IV. Rozumowanie i argumentacja. 3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.	XVII. Wielokąty. Uczeń: 5) stosuje wzory na pole trójkąta [...] przedstawionych[ego] na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych [...].	36
15.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.	IX. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi. Uczeń: 4) stosuje oznaczenia literowe nieznanymi wielkośći liczbowych i zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych. XIX. Geometria przestrzenna. Uczeń: 6) oblicza [...] pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych.	56
16.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.	XXII. Zadania tekstowe. Uczeń: 5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje zdobytą wiedzę z zakresu arytmetyki [...] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. XII. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń: 4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą [...]. IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka.	43

17.	IV. Rozumowanie i argumentacja. 3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.	XVI. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń: 4) zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość kątów przy podstawie); 6) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego). XVII. Wielokąty. Uczeń: 5) stosuje wzory na pole [...] trapezu [...] przedstawionych[ego] na rysunku [...].	53
18.	II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.	XXI. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń: 1) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, za pomocą tabel [...]. XXII. Zadania tekstowe. Uczeń: 5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje zdobytą wiedzę z zakresu arytmetyki [...] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.	58
19.	III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	XIX. Geometria przestrzenna. Uczeń: 6) oblicza objętości [...] ostrosłupów prawidłowych. XII. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń: 5) przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych [...].	38



**Poziom wykonania zadań w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności****WYKRES 4.** POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW UMIEJĘTNOŚCI

## Komentarz

Arkusz egzaminacyjny składał się z 19 zadań. W zestawie nie było zadań bardzo trudnych. Uczniowie uzyskali średnio za rozwiązanie zadań zamkniętych 63% punktów możliwych do zdobycia, a za rozwiązanie zadań otwartych – 49% punktów.

Najliczniejszą grupę stanowiło dziesięć zadań umiarkowanie trudnych (poziom wykonania od 51% do 69%). Trzy zadania były trudne (poziom wykonania od 36% do 43%), sześć zadań łatwych (poziom wykonania od 70% do 75%).

Pierwsze wymaganie ogólne, czyli **sprawność rachunkowa**, sprawdzana była trzema zadaniami zamkniętymi: 2., 4. i 10. Zdający zdobyli za ich rozwiązanie średnio 61% punktów możliwych do uzyskania. Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się **zadanie 10**. W tym zadaniu udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało od uczniów wykonania prostych obliczeń zegarowych na godzinach i minutach. Zadanie poprawnie rozwiązało 72% zdających. Przykłady 1. i 2. ilustrują poprawne sposoby rozwiązania zamieszczone w brudnopisie.

### Przykład 1.

$17^{31}$  - był  
 $17^{27}$  - powinien być  
 2h 54 min - trasa  
 $17^{27} - 2h \rightarrow 15^{27} - 27 \text{ min} \rightarrow 15^{00} - 27 \text{ min} \rightarrow 14^{33}$

### Przykład 2.

Olaszyn Gdynia  
? 17:31  
 podróż trwa = 2h i 54 min + 4 min  
 4 minuty opóźnienia  
 $17:31 \xrightarrow{-8 \text{ min}} 17:23 \xrightarrow{-50 \text{ min}} 16:33$   
 $16:33 \xrightarrow{-2 \text{ h}} 14:33$   
 $17:00$   
 $16:30$   
 $-27$   
 $27$

**Zadanie 2.** poprawnie rozwiązało 57% zdających. Ósmoklasiści mieli za zadanie wskazanie liczby wszystkich ułamków spełniających trzy warunki. Sposób poszukiwania odpowiedzi prezentuje przykład 3.

### Przykład 3.

$\frac{5}{4}$   $\frac{8}{4}$   
 $\frac{13}{4}$   $\frac{14}{4}$   $\frac{15}{4}$   $\frac{16}{4}$   $\frac{17}{4}$   $\frac{18}{4}$   $\frac{19}{4}$  5  
 $3\frac{1}{4}$   $3\frac{2}{4}$   $3\frac{3}{4}$   $4$   $4\frac{1}{4}$   $4\frac{2}{4}$   $4\frac{3}{4}$   $\frac{20}{4}$

Analizując wyniki, można zauważyć, że trudność sprawiało uczniom nie tyle wypisanie ułamków o mianowniku 4, z których każdy ma większy licznik od mianownika, ale wybranie spośród ułamków tych, które są zawarte między dwiema liczbami naturalnymi. Prawie 28% uczniów wskazało o jeden lub dwa ułamki więcej, zaliczając do zbioru liczb spełniających wskazane warunki ułamek  $\frac{12}{4}$  lub  $\frac{20}{4}$ , co obrazuje rozwiązanie zamieszczone w przykładzie 4.

#### Przykład 4.

zadanie 2.

większy od 3      mniejszy od 5

$\frac{5}{4}$	$\frac{6}{4}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{8}{4}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{10}{4}$	$\frac{11}{4}$	$\frac{12}{4}$	$\frac{13}{4}$
<del><math>-\frac{1}{4}</math></del>	<del><math>-\frac{1}{2}</math></del>	<del><math>-\frac{1}{4}</math></del>	<del><math>-\frac{1}{2}</math></del>	<del><math>-\frac{1}{4}</math></del>	<del><math>-\frac{1}{2}</math></del>	<del><math>-\frac{3}{4}</math></del>	3	$3\frac{1}{4}$

$\frac{14}{4}$	$\frac{15}{4}$	$\frac{16}{4}$	$\frac{17}{4}$	$\frac{18}{4}$	$\frac{19}{4}$	$\frac{20}{4}$	<del><math>\frac{21}{4}</math></del>	<del><math>\frac{22}{4}</math></del>	<del><math>\frac{23}{4}</math></del>
$3\frac{2}{4}$	$3\frac{3}{4}$	4	$4\frac{1}{4}$	$4\frac{2}{4}$	$4\frac{3}{4}$	5			

Kluczem do wskazania poprawnej odpowiedzi w **zadaniu 4.** była przede wszystkim sprawność rachunkowa. Zadanie to poprawnie rozwiązało 54% zdających.

Większość uczniów, aby rozwiązać zadanie, obliczyła iloczyn i sumę ułamków, a następnie w oparciu o uzyskane wyniki wskazywała uzupełnienie zdań.

Dodanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach i różnych znakach sprawiło trudności co piątemu zdającemu, trudniejsze okazało się porównanie ułamków zwykłych o różnych znakach, z czym nie poradziło sobie prawie 35% ósmoklasistów. Przykład 5. pokazuje brak umiejętności w zakresie mnożenia ułamków zwykłych.

#### Przykład 5.

$$x = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{12}{15} \cdot \left(-\frac{20}{15}\right) = -\frac{240}{15} = -16$$

$$= -8$$
  


$$y = \frac{4}{5} + \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{5} - \frac{4}{3} = \frac{12}{15} - \frac{20}{15} = -\frac{8}{15}$$

Drugie wymaganie ogólne, czyli **wykorzystanie i tworzenie informacji**, sprawdzane było czterema zadaniami zamkniętymi: 1., 9., 11. i 12. oraz jednym zadaniem otwartym –18. Zdający uzyskali za ich rozwiązanie średnio 65% punktów możliwych do zdobycia.

Najłatwiejsze w tym obszarze i w całym arkuszu dla tegorocznych ósmoklasistów okazało się **zadanie 12.**, które dotyczyło znajdowania współrzędnych danych punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Zadanie poprawnie rozwiązało 75% uczniów.

Przykład 6. prezentuje poprawny sposób rozwiązania zamieszczony w brudnopisie.

### Przykład 6.



zadanie 12.

$$P_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow P_2 = \begin{pmatrix} x_4 + x_3 \\ y_4 + y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Niewiele trudniejsze okazały się zadania 9. i 11., które poprawnie rozwiązało odpowiednio 71% i 70% piszących oraz zadanie 1., w którym poprawną odpowiedź wskazało 69% uczniów.

W **zadaniu 1.** uczniowie musieli zinterpretować dane przedstawione na diagramie słupkowym, a następnie wykorzystać je do oceny zdań. Rozwiązanie tego zadania wymagało wykazania się umiejętnością wykonywania obliczeń procentowych – obliczenia procentu danej liczby – oraz umiejętnością wykonania prostych obliczeń zegarowych na godzinach i minutach. Z oceną pierwszego zdania poradziło sobie 83% uczniów, odczytali oni poprawnie z diagramu słupkowego czas przeznaczony na naukę języka hiszpańskiego od poniedziałku do czwartku, a następnie obliczyli łączny czas nauki w tych dniach. Prawie 17% ósmoklasistów nie poradziło sobie z poprawnym obliczeniem, o ile procent jedna liczba jest mniejsza od drugiej liczby. Część błędnych odpowiedzi spowodowana była tym, że uczniowie obliczali, jaki procent czasu przeznaczanego na naukę w piątek stanowi czas przeznaczony na naukę w sobotę (przykład 7.).

### Przykład 7.

$$\begin{aligned} 50 &- \text{sob} \\ 50 &- \text{pt} \\ 50 &- 100\% \\ 30 &- x\% \\ 30 \cdot \frac{100}{x} &= 60 \\ \frac{3000}{x} &= 60 \end{aligned}$$

Przykład 8. ilustruje w pełni poprawne obliczenia potrzebne do oceny drugiego zdania przedstawione w brudnopisie. Uczeń obliczył, o ile czasu mniej poświęciłaby Ala na naukę w sobotę, gdyby ten czas stanowił 40% czasu przeznaczanego na naukę w piątek. Po weryfikacji otrzymanego wyniku z diagramem zdający wskazał poprawną odpowiedź.

### Przykład 8.

$$\begin{aligned} 50 &- 100\% \\ x &- 40\% \\ 50 \cdot 40 &= 100x \\ 2000 &= 100x \quad / : 100 \\ 20 &= x \end{aligned}$$

**Zadanie 9.** dotyczyło wyrażeń algebraicznych. Zadaniem ucznia było wykonanie mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian, a następnie przeprowadzenie redukcji wyrazów podobnych powstałych z mnożenia tych sum. Poprawne rozwiązanie ilustruje przykład 9.

**Przykład 9.**

Brdnopis (nie podlega ocenie)

$$\overbrace{x(x+4)} - \overbrace{3(2x-5)} = \overbrace{x^2+4x} - \overbrace{6x+15} = x^2 - 2x + 15$$

Ponad 13% ósmoklasistów przy mnożeniu sumy algebraicznej przez jednomian błędnie ustaliło znak współczynnika jednomianu.

Co piąty uczeń podczas mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian  $x$  pomnożył każdy składnik sumy przez ten jednomian, ale podczas mnożenia drugiej sumy przez liczbę  $(-3)$  błędnie ustalił znak jednomianu.

Dodatkową trudnością sprzyjającą popełnieniu błędu była redukcja wyrazów podobnych. Przykłady 10. i 11. ilustrują takie rozwiązania.

**Przykład 10.**

$$x(x+4) - 3(2x-5) = \cancel{2x+4x} - 3(2x-5) = 2x+4x - 6x + 15 = x^2 + 4x - 6x + 15 = x^2 + 2x + 15$$

**Przykład 11.**

$$\begin{aligned} x(x+4) - 3(2x-5) &= \\ &= x^2 + 4x - 6x - 15 \\ &= x^2 - 2x - 15 \end{aligned}$$

W brudnopisach uczniów znalazło się wiele zapisów świadczących o braku umiejętności wykonywania przekształceń wyrażeń algebraicznych, co przedstawiono w przykładach: 12., 13. i 14.

**Przykład 12.**

$$\begin{aligned} & \overbrace{x(x+4)} - \overbrace{3(2x-5)} \\ & x^2 + 2x + 3 - 2x - 5 = \end{aligned}$$

**Przykład 13.**

$$\begin{aligned} & x(x+4) - 3(2x-5) = \\ & = x^2 - 3 - 2 \cdot 2x - 4 \end{aligned}$$

**Przykład 14.**

$$\begin{aligned} & x^1(x+4) - 3(2x-5) \\ & 1+4=5-3=2 \\ & 2x-5=2 \end{aligned}$$

**Zadanie 11.**, typu prawda-falsz, wymagało umiejętności interpretowania danych przedstawionych na wykresie oraz zastosowania proporcjonalności prostej. Poprawnej oceny obu zdań dokonało 70% zdających.

**Zadanie 18.**, otwarte, sprawdzające **wykorzystanie i tworzenie informacji** było dla tegorocznych ósmoklasistów umiarkowanie trudne – uczniowie uzyskali za jego rozwiązanie średnio 58% punktów możliwych do zdobycia.

Rozwiązując zadanie 18., trzeba było wykazać się umiejętnością odczytania danych przedstawionych w treści zadania i w tabeli, zastosowania wiedzy z zakresu arytmetyki do rozwiązania zadania osadzonego w kontekście praktycznym oraz sprawnością rachunkową.

Kluczem do rozwiązania problemu było – w zależności od przedstawionego sposobu rozwiązania – ustalenie liczby średnich i małych opakowań z truskawkami albo ustalenie ceny 1 kg truskawek sprzedawanych w średnich i małych opakowaniach. W kolejnym kroku należało wykazać się umiejętnością obliczenia kwot uzyskanych ze sprzedaży truskawek w każdym z trzech rodzajów opakowań, a następnie obliczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży wszystkich truskawek.

Ponad 33% zdających bezbłędnie rozwiązało zadanie. Przykłady od 15. do 18. ilustrują w pełni poprawne, najczęściej stosowane przez ósmoklasistów, rozwiązania. W wymienionych przykładach zdający poprawnie ustalili masy truskawek sprzedawanych we wszystkich rodzajach opakowań. Następnie obliczyli liczby średnich i małych opakowań, które były potrzebne do zapisania wyrażeń arytmetycznych prowadzących do obliczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży wszystkich truskawek.

### Przykład 15.

120 kg

połowa - duże - 60 kg  
(120 : 2 = 60)

pozostałe - małe - 48 kg  
(120 - 60 = 60)  
(60 : 1,25 = 48)

10% - średnie - 12 kg  
(10% z 120 = 12)

1 kg - 18 zł  
60 · 18 = 1080 zł

0,5 kg - 10 zł  
12 · 2 = 24  
24 · 10 = 240 zł

0,25 kg - 6 zł  
48 · 4 = 192  
192 · 6 = 1152 zł

1  
+ 240  
1080  
+ 1152  
2472

Odpowiedź: Pan Jan ze sprzedaży wszystkich truskawek otrzymał 2472 zł.

## Przykład 16.

wszystkie truskawki - 120kg  
 truskawki sprzedawane w opakowaniach:  
 dużych -  $\frac{1}{2} \cdot \frac{120}{1} = 60$  kg  
 średnich -  $0,1 \cdot 120 = 12$  kg  
 małych -  $120 - (60 + 12) = 120 - 72 = 48$  kg  
 ilość opakowań:  
 dużych -  $60 : 1 = 60$   
 średnich -  $12 : 0,5 = 24$   
 małych -  $48 : 0,25 = 192$   
 cena za opakowania:  
 duże -  $60 \cdot 18 = 1080$  (zł)  
 średnie -  $24 \cdot 10 = 240$  (zł)  
 małe -  $192 \cdot 6 = 1152$  (zł)  
 suma:  $1080 + 240 + 1152 = 2472$  (zł)  
 Odp.: Pan Jan ze sprzedaży wszystkich truskawek otrzymał 2472 zł.

## Przykład 17.

120kg - wszystkie truskawki  
 $120 \text{ kg} : 2 = 60 \text{ kg}$  - w dużych ~~opakowaniach~~ opakowaniach ✓  
 $120 \text{ kg} \cdot 0,1 = 12 \text{ kg}$  - w średnich opakowaniach  
 $120 \text{ kg} - 60 \text{ kg} - 12 \text{ kg} = 48 \text{ kg}$  - w małych opakowaniach  
~~60~~  $60 \text{ kg} \cdot 18 \text{ zł} = 1080 \text{ zł}$   
 $12 \text{ kg} : 0,5 \text{ kg} \cdot 10 \text{ zł} = 24 \cdot 10 \text{ zł} = 240 \text{ zł}$   
 $48 \text{ kg} : 0,25 \cdot 6 \text{ zł} = 192 \cdot 6 \text{ zł} = 1152 \text{ zł}$   
 $1080 \text{ zł} + 240 \text{ zł} + 1152 \text{ zł} = \underline{2472 \text{ zł}}$   
 Odp. Pan Jan na sprzedaży wszystkich truskawek zarobił 2472 zł.

**Przykład 18.**

120 kg wszystkie

<p>Duże <math>120\text{kg} : 2 = 60\text{kg}</math>  <math>18\text{zł} \cdot 60 = 1080\text{zł}</math></p>	<p>Małe <math>120 - 60 - 12 = 48\text{kg}</math>  <math>48 \cdot 4 = 192</math>  <math>192 \cdot 6 = 1152\text{zł}</math></p>
--	---

Średnie  $12\text{kg}$   $240\text{zł}$

$120 - 100\%$   
 $x - 10\%$   
 $1200 - 100x = 100x$   
 $12 - x$   
 $12 \cdot \frac{10}{100} = 1,2$   
 $24 \cdot 10 = 240\text{zł}$

○ - opakowania

<p>Razem  <math>1080\text{zł} + 240\text{zł} + 1152\text{zł} = 2472\text{zł}</math></p>
---

Odp: Pan Jan za sprzedaż truskawek otrzymał  $2472\text{zł}$ .

$\begin{array}{r} 60 \\ 18 \\ \hline 480 \\ 60 \\ \hline 1080 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ 48 \\ 4 \\ \hline 192 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ 192 \\ 6 \\ \hline 1152 \end{array}$
--	---	---

Przykład 19. ilustruje arytmetyczny sposób rozwiązania zadania, w którym zdający rozwiązał zadanie, ustalając ceny 1 kg truskawek sprzedawanych w średnich oraz małych opakowaniach.

**Przykład 19.**

<p>120 kg - 100%          60 kg - 50%          12 kg - 10%</p> <p><math>100\% - 60\% = 40\%</math>  <math>48\text{kg} - 40\%</math></p>	<p>60 kg - duże opakowania          12 kg - średnie opakowania          48 kg - małe opakowania</p>
---	---

<p>DUŻE:</p> <p><math>1\text{kg} - 18\text{zł} \quad   \cdot 60</math>  <math>60\text{kg} - 1080\text{zł}</math></p>	<p>ŚREDNIE:</p> <p><math>0,5\text{kg} - 10\text{zł}</math>  <math>1\text{kg} - 20\text{zł} \quad   \cdot 12</math>  <math>12\text{kg} - 240\text{zł}</math></p>	<p>MAŁE:</p> <p><math>0,25\text{kg} - 6\text{zł} \quad   \cdot 4</math>  <math>1\text{kg} - 24\text{zł} \quad   \cdot 48</math>  <math>48\text{kg} - 1152\text{zł}</math></p>
--	---	---

$1080\text{zł} + 240\text{zł} + 1152\text{zł} = 1080\text{zł} + 1392\text{zł} = 2472\text{zł}$



Przykład 20. ilustruje rozwiązanie zadania z zastosowaniem wielkości wprost proporcjonalnych. Zdający wykorzystał zależność między ceną truskawek sprzedawanych w danym rodzaju opakowania a masą sprzedanych truskawek.

**Przykład 20.**

60kg - duże opak.  
12kg - śr. opak.  
48kg - małe

100% - 120kg  
18% - x = 12

60 + 12 = 72    120 - 72 = 48

Obliczenia:

60kg - 1kg -  
1kg - 18zł     $x_d = \frac{60 \cdot 18}{1} = 1080zł$  (duże opakowanie)  
60kg - xzł

12kg - 0,5kg - 10zł  
12kg - xzł     $x_s = \frac{12 \cdot 10}{0,5} = \frac{120}{0,5} = 240zł$  (średnie opakowanie)

48kg - 0,25kg - 6zł  
48kg - xzł     $x_m = \frac{48 \cdot 6}{0,25} = \frac{288}{0,25} = 1152zł$  (małe opakowanie)

1080zł + 240zł + 1152zł  
= 1320 + 1152  
= 2472zł

Odp.: Pan Jan ze wszystkich sprzedanych otrzymał 2472zł.

Prawie co czwarty zdający uzyskał za to zadanie 2 punkty. W tej grupie uczniów często zawodziła sprawność rachunkowa (przykład 21.).

**Przykład 21.**

120kg : 2 = 60kg - duże opakowanie  
10% z 120kg  
 $\frac{10}{100} \cdot 120 = 12kg$  - średnie  
120kg - (60kg + 12kg) = 120kg - 72kg = 48kg - małe

60kg : 1kg = 60 - sprzedaj dużych  
 $12kg : 0,5kg = 24$  - sprzedaj średnich  
48kg : 0,25kg = 192 - sprzedaj małych

60 · 18 + 24 · 10 + 192 · 6 = 1080 + 240 + 1152 = 2472 (zł) - zarobek

Odp.: Pan Jan otrzymał ze sprzedaży 2472zł.

**błąd rachunkowy**

$\frac{18}{108} \cdot \frac{6}{108} = 12 \cdot \frac{10}{5} = 24$  - sprzedaj średnich

Zdarzały się rozwiązania, w których uczniowie pozostawiali rozwiązanie zadania na etapie obliczenia kosztu zakupu truskawek w każdym rodzaju opakowań, ale nie obliczyli łącznej kwoty uzyskanej ze sprzedaży wszystkich truskawek (przykład 22.).

**Przykład 22.**

$50\% \text{ z } 120 \text{ kg} - \text{ duże opakowania} - \text{ po } 1 \text{ kg}, \text{ łącznie } 60 \text{ kg}$   
 $10\% \text{ z } 120 \text{ kg} - \text{ średnie opakowania} - \text{ po } 0,5 \text{ kg}, \text{ łącznie } 12 \text{ kg}$   
 $40\% \text{ z } 120 \text{ kg} - \text{ małe opakowania} - \text{ po } 0,25 \text{ kg}, \text{ łącznie } 48 \text{ kg}$   
 ilość sprzedanych dużych opakowań  $-\frac{60 \text{ kg}}{1 \text{ kg}} = 60 \text{ opakowań}$   
 ilość sprzedanych średnich opakowań  $-\frac{12 \text{ kg}}{0,5 \text{ kg}} = 24 \text{ opakowania}$   
 ilość sprzedanych małych opakowań  $-\frac{48 \text{ kg}}{0,25 \text{ kg}} = 192 \text{ opakowania}$   
~~przebieg sprzedaży opakowań  $60 + 24 + 192 = 276$~~

$\begin{array}{r} 60 \\ 192 \\ - 6 \\ \hline 1152 \\ + 24 \\ \hline 1176 \end{array}$	$\begin{array}{r} 24 \\ 110 \\ + 60 \\ \hline 194 \end{array}$	$\begin{array}{r} 60 \\ 118 \\ + 60 \\ \hline 1080 \end{array}$	$\begin{array}{r} 48 : 0,25 = 192 \\ = 4800 : 25 \\ \hline 192 \\ \underline{4800} \\ -25 \\ \hline 270 \\ -20 \\ \hline 220 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 12 : 0,5 = 24 \\ = 120 : 5 \\ \hline 24 \\ \underline{120} \\ -10 \\ \hline 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 60 : 1 = 60 \\ \hline 60 \\ \underline{60} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 25 \\ 10 \\ 19 \\ \hline 100 \\ 100 \\ \hline 200 \\ 20 \\ \hline 220 \end{array}$
---	--	---	--	--	--	--

przychód z dużych opakowań  $- 60 \cdot 18 \text{ zł} = 1080 \text{ zł}$   
 przychód z średnich opakowań  $- 24 \cdot 10 \text{ zł} = 240 \text{ zł}$   
 przychód z małych opakowań  $- 192 \cdot 6 \text{ zł} = 1152 \text{ zł}$

Dwa punkty za rozwiązanie zadania 18. otrzymywali również uczniowie, którzy przedstawili poprawny sposób obliczenia kwot uzyskanych ze sprzedaży truskawek w co najmniej dwóch rodzajach opakowań. (przykład 23.).

**Przykład 23.**

$120 \text{ kg} - \text{wszystkie}$   
 $\frac{120 \text{ kg}}{2} = 60 \text{ kg} - \text{Duże opakowania}$   
 $\frac{10}{100} \cdot \frac{120}{2} = 12 \text{ kg} - \text{Średnie opakowania}$   
 $120 \text{ kg} - 60 \text{ kg} - 12 \text{ kg} = 48 \text{ kg} - \text{Małe opakowania}$

Duże (1kg  $\rightarrow$  18zł)  
 $60 \cdot 18 = 1080 \text{ zł}$

Średnie: (0,5kg  $\rightarrow$  10zł)  
 ~~$120 \cdot 0,5 = 60$~~   $12 \cdot 0,5 = 24$   
 $10 \cdot 24 = 240 \text{ zł}$

Małe: (0,25kg  $\rightarrow$  6zł)  
 $48 \cdot 0,25 = 192 \text{ zł}$

$1080 + 240 + 192 = 1512 \text{ zł}$   
 Odp: Pan Jan otrzymał kwotę 1512 zł.

poprawnie obliczone kwoty ze sprzedaży truskawek w dużych i średnich opakowaniach

błędnie obliczona kwota ze sprzedaży truskawek w małych opakowaniach

W przykładzie 24. ósmoklasista do wyznaczenia masy truskawek w małych opakowaniach wykorzystał błędnie obliczoną masę truskawek w średnich opakowaniach i konsekwentnie do popełnionego błędu doprowadził rozwiązanie zadania do końca.

**Przykład 24.**

$120 : 2 = 60 \text{ kg} - \text{sprowadzone w dużym opakowaniu}$   
 $60 : 18 \text{ zł} = 1080 \text{ zł} - \text{kwota za truskawki w dużym opakowaniu}$

$60 - 6 \text{ kg} = 54 \text{ kg}$  w małych opakowaniach  
 $\frac{60}{60} = \frac{100\%}{100\%}$   
 $\frac{6}{60} = \frac{10\%}{100\%}$   
 $\downarrow$  truskawki w średnich opakowaniach

~~$0,5 \text{ kg} \cdot 6 = 3 \text{ kg}$~~   $12 \cdot 0,5 \text{ kg} = 10 \text{ zł}$   
 $1 \text{ kg} \cdot 0,5 \text{ kg} = 10 \text{ zł}$   
 $2 \text{ kg} \cdot 0,5 \text{ kg} = 10 \text{ zł}$   
 $3 \text{ kg} \cdot 0,5 \text{ kg} = 10 \text{ zł}$

$60 \text{ zł} \cdot 2 = 120 \text{ zł} - \text{zwrócić na truskawki w średnim opakowaniu}$

$4 \cdot 54 \text{ kg} = 216$   $216 \cdot 6 = 1296 \text{ zł} - \text{kwota za truskawki w małym opakowaniu}$

$1080 \text{ zł} + 120 \text{ zł} + 1296 \text{ zł} = 2496 \text{ zł}$

Odp: Pan Jan za sprzedane truskawki otrzymał 2496 zł.



W rozwiązaniu zamieszczonym w przykładzie 27. uczeń przyjmuje jednakową cenę dla każdego rodzaju opakowania, nie korzysta z danych zamieszczonych w tabeli.

**Przykład 27.**

$120 \text{ kg} : 2 = 60 \text{ kg}$   
 $60 \text{ kg}$  - masa truskawek sprzedanych w dużych opakowaniach  
 $1 \text{ kg} = 18 \text{ zł}$        $60 \text{ kg} = 1080 \text{ zł}$

$$\begin{array}{r} 18 \\ \times 60 \\ \hline 1080 \end{array}$$

$1080 \text{ zł}$  - pieniądze otrzymane z sprzedaży w dużych opakowaniach

$100\% = 120 \text{ zł/kg}$   
 $\downarrow : 10$        $\downarrow : 10$   
 $10\% = 12 \text{ zł/kg}$

$12 \text{ kg}$  - masa truskawek sprzedanych w średnich opakowaniach

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 18 \\ \hline 216 \end{array}$$

$12 \text{ kg} = 216 \text{ zł}$   
 $216 \text{ zł}$  - pieniądze otrzymane ze sprzedaży w średnich opakowaniach

**poprawny sposób obliczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży truskawek w dużych opakowaniach**

**niepoprawny sposób obliczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży truskawek w średnich opakowaniach**

Najwięcej trudności sprawiło ósmoklasistom obliczenie liczby średnich i małych opakowań, w których sprzedawane były truskawki (przykład 28.).

**Przykład 28.**

$60 \text{ kg}$  - w dużych opakowaniach       $18 \cdot 60 = 1080 \text{ zł}$   
 $12 \text{ kg}$  - w średnich       $12 : 2 = 6$        $6 \cdot 10 = 60 \text{ zł}$   
 $48 \text{ kg}$  - w małych       $48 : 4 = 12$        $12 \cdot 6 = 72 \text{ zł}$

$1080 + 60 + 72 = 1212 \text{ zł}$

Odp. Pan Jan w sumie ze sprzedaży truskawek otrzymał kwotę  $1212 \text{ zł}$ .

**niepoprawny sposób obliczenia liczby średnich i małych opakowań**

Ponad 17% zdających otrzymało za to zadanie 0 punktów. Wśród nich byli uczniowie, którzy niepoprawnie zinterpretowali jego treść (przykłady 29. i 30.) oraz uczniowie, którzy nie podjęli próby rozwiązania.

**Przykład 29.**

$120 \text{ kg} - 100\%$   
 $110 \text{ kg} - 50\%$   
 $11 \text{ kg} - 10\%$

$110 \text{ kg} \cdot 18\% = 19,8 \text{ zł}$  (niepoprawnie)  
~~110 kg \* 18% = 19,8 zł~~  
 $0,5 \cdot 11 \text{ kg} = 5,5 \text{ kg}$   
 $5,5 \text{ kg} \cdot 10 \text{ zł} = 55 \text{ zł}$   
 $1,45 \cdot 2,5 \text{ kg} = 3,625 \text{ kg}$   
 $3,625 \text{ kg} \cdot 6 \text{ zł} = 21,75 \text{ zł}$   
 $128 + 55 + 21,75 = 204,75 \text{ zł}$

Odp: Pan Jan ze sprzedaży wszystkich tuskawek zarobił 204,75 zł.

**Przykład 30.**

$x$  - notowa masa tuskawek

~~$120 \text{ kg} - 19 \text{ zł} =$~~   
 $120 \text{ kg} \cdot 70\% = 84 \text{ kg}$   
 $6,5 \text{ kg} \cdot 12 \text{ zł} = 78 \text{ zł}$

odp: Pan Jan sprzedał tuskawek po 3,25 kg każdego dnia aż miał 120 kg sprzedanych


Trzecie wymaganie ogólne, czyli **wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji**, sprawdzane było ośmioma zadaniami, w tym sześcioma zamkniętymi (zadania 3., 5., 6., 7., 8., 15.) oraz dwoma otwartymi (zadania 16., 19.).

Za ich rozwiązanie zdający uzyskali średnio 53% punktów możliwych do zdobycia.

Najłatwiejsze w tej grupie okazało się **zadanie 5.**, w którym poprawną odpowiedź wskazało 70% tegorocznych ósmoklasistów. W tym zadaniu, aby obliczyć miarę kąta, należało wykorzystać własności kątów w równoległoboku, kątów przyległych oraz zastosować twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.

Treść zadania wzbogacono rysunkiem, który uczniowie często wykorzystywali do rozwiązania. Niektórzy rysowali trapez i zapisywali rozwiązanie w brudnopisie. Przykład 31. ilustruje poprawne rozwiązanie tego zadania.

### Przykład 31.



Ponad 17% zdających wskazało jako odpowiedź kąt ostry równoległoboku tj.  $45^\circ$ .

Nieco trudniejsze były zadania 3. i 8. (poziom wykonania – odpowiednio 68% i 66%).

**Zadanie 3.** – typu prawda-falsz – w którym uczeń musiał dokonać oceny dwóch zdań, wymagało od uczniów umiejętności obliczenia średniej arytmetycznej. Oceniając pierwsze zdanie, uczniowie postępowali na dwa sposoby: wyznaczyli  $k$  jako niewiadomą z równania (przykład 32.) lub sprawdzali, czy po podstawieniu za zmienną  $k$  liczby 22 otrzymają średnią równą 16 (przykład 33.). Do prawidłowej oceny drugiego zdania musieli oszacować lub obliczyć średnią arytmetyczną pięciu liczb. Poniższe przykłady ilustrują poprawne sposoby rozwiązania i oceny obu zdań.

### Przykład 32.

$$\frac{12+14+k}{5} = 16 \quad / \cdot 5$$

$$26+k = 80$$

$$k = 54$$

$$\frac{12+14+22+11+17}{5} = \frac{76}{5} = 15 \frac{1}{5} = 15,2$$

### Przykład 33.

$$3. \quad \frac{12+14+22}{3} = \frac{48}{3} = 16 \quad P$$

$$\frac{12+14+22+11+17}{5} = \frac{58+17}{5} = \frac{76}{5} = 15 \frac{1}{5} < 16 \quad F$$

W rozwiązaniach uczniowskich tego zadania zdarzały się błędy zarówno rachunkowe, jak i merytoryczne (błędne sposoby obliczania średniej arytmetycznej).

**Zadanie 8.** było dla zdających umiarkowanie trudne. Uczeń musiał obliczyć prawdopodobieństwo wyciągnięcia balonu w kolorze czerwonym, wiedząc, że wcześniej zostały wyciągnięte dwa balony w tym kolorze. Poprawnie rozwiązało to zadanie 66% zdających (przykład 34.).

**Przykład 34.**

$$8 = 10 + 8 + 8 + 6 = 10 + 16 + 6 = 10 + 22 = 32$$

$$32 - 2 = 30$$

$$10 - 2 = 8$$

$$\frac{8}{30} = \frac{4}{15}$$

Prawie 11% zdający obliczyło liczbę wszystkich balonów w pudełku oraz liczbę wszystkich balonów czerwonych, ale przy obliczaniu prawdopodobieństwa nie uwzględniło informacji, że z pudełka zostały wyjęte dwa balony (przykład 35.).

**Przykład 35.**

$$10 + 8 + 8 + 6 = 10 + 16 + 6 = 26 + 6 = 32$$

$$\frac{10}{32} = \frac{5}{16}$$

Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci balon losowo wyjęty przez Karolinę będzie w kolorze czerwonym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.  $\frac{1}{3}$

~~B.  $\frac{5}{16}$~~

C.  $\frac{4}{15}$

D.  $\frac{1}{4}$

Ponad 14% uczniów poprawnie obliczyło liczbę balonów czerwonych, ale nie uwzględniło, że liczba wszystkich balonów też się zmieniła, co ilustruje przykład 36.

**Przykład 36.**

$$\frac{10}{32} = \frac{1}{4}$$

Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci balon losowo wyjęty przez Karolinę będzie w kolorze czerwonym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.  $\frac{1}{4}$

B.  $\frac{4}{15}$

C.  $\frac{5}{16}$

D.  $\frac{1}{3}$



Zdarzały się również prace, w których uczniowie poprawnie wskazywali liczbę wszystkich balonów, ale nie uwzględnili zmiany liczby balonów w kolorze czerwonym (przykład 37.).

### Przykład 37.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci balon losowo wyjęty przez Karolinę będzie w kolorze czerwonym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.  $\frac{1}{4}$

B.  $\frac{4}{15}$

C.  $\frac{5}{16}$

~~D.  $\frac{1}{3}$~~

**Zadanie 15.** sprawdzało umiejętność zapisywania zależności między polami: podstawy, powierzchni bocznej oraz jednej ściany bocznej ostrosłupa. W treści zadania pola te przedstawione zostały w postaci wyrażeń algebraicznych. Poprawnej odpowiedzi w tym zadaniu udzieliło 56% zdających.

Prawie 77% uczniów nie miało problemu z poprawnym uzupełnieniem pierwszego zdania, potrafili oni wyznaczyć pole powierzchni bocznej ostrosłupa przy danej wartości pola jednej ściany bocznej. Drugie zdanie, w którym należało porównać pole powierzchni podstawy z polem ściany bocznej, okazało się trudniejsze do uzupełnienia – błędną odpowiedź wybrało 35% zdających.

W rozwiązaniu zadania uczniowie często wspomagali się rysunkiem ostrosłupa (przykład 38.)

### Przykład 38.

Najtrudniejsze, wśród zadań zamkniętych, w tej grupie zadań okazały się zadania 6. i 7.

W **zadaniu 6.** poprawnej odpowiedzi udzieliło 51% zdających. W rozwiązaniu tego zadania uczeń musiał wykazać się umiejętnością przekształcania wzoru. Rozwiązania bezbłędne pokazane są w przykładach 39. i 40.

**Przykład 39.**

$$y = 5x \cdot W$$

$$W = \frac{y}{5x}$$

$$5x = \frac{y}{5} \quad | :5$$

$$x = \frac{y}{25}$$

**Przykład 40.**

$$5x = \frac{y}{5} \quad | :5$$

$$x = \frac{y}{25}$$

$$5x = \frac{y}{5}$$

$$5x = y : w \quad | \cdot w$$

$$5x \cdot w = y$$

$$w = \frac{y}{5x}$$

W tym zadaniu odpowiedź z błędnie wyznaczoną niewiadomą  $y$  wskazało 49% uczniów.

**Zadanie 7.**, typu prawda-falsz, w którym poprawnej oceny obu zdań dokonało 55% uczniów, wymagało od zdających umiejętności wykonywania działań na potęgach. Do oceny pierwszego zdania potrzebna była umiejętność potęgowania potęgi oraz mnożenia potęg o wykładnikach całkowitych dodatnich, natomiast w ocenie drugiego zdania – umiejętność mnożenia i dzielenia potęg o wykładnikach całkowitych dodatnich. Poprawny sposób rozwiązania ilustruje przykład 41.

**Przykład 41.**

$$3 \cdot 9^5 = 3 \cdot (3^2)^5 = 3 \cdot 3^{10} = 3^{11}$$

$$\frac{2^8 \cdot 2^4}{2^{10}} = \frac{2^{12}}{2^{10}} = 2^2$$

Pierwsze zdanie poprawnie oceniło przeszło 72% ósmoklasistów – wykazali się oni umiejętnościami przekształcania iloczynu potęg oraz potęgowania potęgi. Z oceną drugiego zdania poradziło sobie prawie 72% uczniów, którzy wykazali się umiejętnością mnożenia i dzielenia potęg o wykładnikach całkowitych.

Najtrudniejsze w tym obszarze wymagań okazały się dla uczniów zadania otwarte: 16. i 19.

Za rozwiązanie **zadania 16.** – dwupunktowego – uczniowie uzyskali średnio 43% punktów możliwych do zdobycia. W zadaniu należało wyznaczyć liczbę elementów jednego zestawu puzzli na podstawie informacji o części puzzli ułożonych przez dwie dziewczynki. Kluczem do rozwiązania problemu było ułożenie równania na podstawie sumy części puzzli ułożonych przez każdą z dziewczynek lub wykorzystanie wielkości wprost proporcjonalnych do wyznaczenia liczby elementów w jednym zestawie puzzli. Nieco ponad 35% zdających bezbłędnie rozwiązało zadanie i otrzymało maksymalną liczbę punktów.

Przykłady od 42. do 48. ilustrują w pełni poprawne rozwiązania różnymi sposobami. Najczęściej ósmoklasiści układali równanie z jedną niewiadomą prowadzące do obliczenia liczby elementów w jednym zestawie puzzli. W rozwiązaniu zadania tym sposobem uczniowie musieli wykazać się umiejętnością dostrzegania zależności między informacjami podanymi w zadaniu, zapisania tych zależności za pomocą wyrażeń algebraicznych oraz zapisania równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Przykład 42. ilustruje rozwiązanie, w którym zdający ułożył równanie z niewiadomą  $x$  oznaczającą liczbę elementów w jednym zestawie puzzli.

### Przykład 42.

$1 \text{ zestaw puzzli} = x / 600$   
 ułożone elementy przez Elę -  $\frac{2}{5}x \quad \left| \frac{2}{5} \cdot \frac{600}{1} = 240 \right.$   
 ułożone elementy przez Anię -  $\frac{1}{3}x \quad \left| \frac{1}{3} \cdot \frac{600}{1} = 200 \right.$   
 $\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3}x + \frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 5}x = 440$   
 $\frac{6}{15}x + \frac{5}{15}x = 440$   
 $\frac{11}{15}x = 440 /: \frac{11}{15}$   
 $x = 600$   
 Odp: Jeden zestaw puzzli składa się z 600 elementów.

Przykład 43. prezentuje rozwiązanie, w którym uczeń do ułożenia równania wykorzystał własność wielkości wprost proporcjonalnych. W tym przykładzie niewiadoma  $x$  oznacza liczbę elementów w jednym zestawie puzzli.

### Przykład 43.

$$\left. \begin{array}{l} E \frac{2}{5} \\ A \frac{1}{3} \end{array} \right\} \text{razem } \frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6+5}{15} = \frac{11}{15} \rightarrow 440$$

$$\frac{11}{15} = 440$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 15 \\ \hline 440 \\ \hline 660 \end{array}$$

całość puzzli  $1 = \frac{15}{15} = *$  ← jeden zestaw puzzli

$$x = \frac{440 \cdot 1}{\frac{11}{15}} = \frac{440 \cdot 15}{11} = 600$$

odp: W jednym zestawie jest 600 puzzli.

Niektórzy uczniowie rozwiązywali zadanie 16. metodą prób i błędów – takie rozwiązanie ilustruje przykład 44.

### Przykład 44.

	puzzle w zestawie	ca. (#)	Amia (#)	Łącznie	
I	1000	400	333,(3)		X
II	800	320	266,(6)		X
III	900	360	300	660	X
IV	600	240	200	440	✓

odp: Wosi' puzzle w jednym zestawie wynosi 600.

Ósmoklasiści wykazali się pomysłowością w sposobach rozwiązania problemu (przykłady od 45. do 47.). Wśród uczniowskich realizacji nie zabrakło również rozwiązań, w których autorzy wspomagali się formą graficzną (przykład 48.).

Przykład 45.

~~$\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}x = 940$~~   
 ~~$\frac{6}{15}x + \frac{5}{15}x = 110$~~   
 ~~$\frac{11}{15}$~~   
 ~~$\frac{11}{30}$~~   
 ~~$\frac{11}{30}x = 940$~~

$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = 80$   
 $\frac{2}{10} + \frac{1}{6} = 640$   
 $\frac{6}{30} + \frac{5}{30} = 110$   
 $\frac{11}{30} = 940$      1:11  
 $\frac{1}{30} = 60$      1:30  
 $\frac{1}{2}x = \text{jeden zestaw}$      330  
 $\frac{1}{2}x = \text{jeden zestaw}$      330  
 $\frac{1}{30} = 1200$   
 Odp.: Jeden zestaw  $x = 1200$      1:2  
 razli składają się z  $\frac{1}{2}x = 600$   
 600 elementów.

usterki w zapisie niewiadomej w mianownikach ułamków

Przykład 46.

$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$   
 $440 \Rightarrow \frac{11}{30}$   
 $400 \Rightarrow \frac{16}{30} \cdot 3$   
 $1200 \Rightarrow \frac{30}{30} = 2x$      1:2  
 $600 = x$   
 $x = \text{liczba ele. w jednym zestawie}$   
 Odp.: jeden zestaw składa się z 600 puzzli

## Przykład 47.

Dane

ułożone puzzle  $\rightarrow 440$        $x \rightarrow$  jedno puzzle

ułożone Eli  $\rightarrow \frac{2}{5}x$

ułożone Ani  $\rightarrow \frac{1}{3}x$

Ani ułożyła  $\frac{5}{11}$  puzzle ułożonych

$A \rightarrow \frac{5}{11} \cdot 440$

$$\frac{5}{11} \cdot 440 = A$$

$$\frac{5 \cdot 440}{11} = A$$

$$\frac{2200}{11} = A$$

$$200 = A$$

$\frac{2}{5}x = 200$        $x = 600$

$\frac{1}{3}x = 200 \quad | \cdot 3$   
 $x = 600$

Odp = Jednym zestawem puzzle  
 składa się z 600 elementów

$$\frac{2}{5} \cdot 600 + \frac{1}{3} \cdot 600 = 440$$

$$240 + 200 = 440$$



Przykład 50. ilustruje rozwiązanie, w którym do pełnego rozwiązania zabrakło końcowego obliczenia. Uczeń zapisał poprawne równanie, przekształcił je wyznaczając niewiadomą  $x$ , jednak nie dokończył obliczeń.

**Przykład 50.**

liczba puzzli Eli -  $x$        $\frac{2}{15}$       11 · 60

-11- Ania -  $x$        $\frac{1}{3}$        $\frac{220}{440}$

~~Wniosek~~

Wniosek: Wszy skich puzzli utworzonych przez Eli =  $\frac{2}{5}x = \frac{6}{15}x$

-11- Ania =  $\frac{1}{3}x = \frac{5}{15}x$

$\frac{6}{15}x + \frac{5}{15}x = 440$        $\frac{11}{15}x = 440$

$\frac{11}{15}x = 440 \quad | : \frac{11}{15}$

$x = \frac{440}{\frac{11}{15}} = \frac{440 \cdot 15}{11} = \frac{660}{11} =$

Przykłady 51. i 52. są ilustracją rozwiązań, w których uczniowie poprawnie zapisali równanie, wykonali poprawne przekształcenia i obliczenia, otrzymując prawidłowy wynik 600. Jednak kontynuowali rozwiązanie zadania, dzieląc otrzymaną liczbę przez 2, co świadczy o błędnej interpretacji liczby puzzli w jednym zestawie.

**Przykład 51.**

E -  $\frac{2}{5} \cdot 2 \cdot x$  } 440 el

A -  $\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot x$  }

ile elementów jedn zestaw?

E  $\frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{15}$

A  $\frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{5}{15}$

~~Wniosek~~ E + A =  $\frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15} = 440 \text{ el}$       nieformalny zapis

$\frac{15}{15} - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$        $\frac{11}{15} = 440 \text{ el}$

$\frac{4}{15} = x$

$x = \frac{4}{15} \times \frac{440}{\frac{11}{15}} = \frac{4}{15} \times \frac{440 \cdot 15}{11} = 4 \times 40 = 160 \text{ el}$

$440 + 160 = 600 \text{ el}$  - całość 2 opakowań puzzli

$600 \text{ el} : 2 = 300 \text{ el}$

Odp: Jeden zestaw puzzli składa się z 300 elementów

błędna interpretacja liczby puzzli w jednym zestawie





W rozwiązaniach uczniowskich często brakowało zapisania równania lub wyrażeń algebraicznych prowadzących do obliczenia liczby elementów puzzli, co ilustruje przykład 54.

### Przykład 54.

$$\left. \begin{array}{l} Ela - \frac{2}{5} \text{ klocków} \\ Aua - \frac{1}{3} \text{ klocków} \end{array} \right\} \text{ŁĄCZNIE 440 ELEMENTY}$$

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = 440$$

$$\frac{6}{15} + \frac{5}{15} = 440$$

$$\frac{11}{15} = 440 \quad \text{ZOSTAŁO } \frac{3}{15} \text{ KLOCKÓW "}$$

$$\begin{array}{r} 100\% - 440 \\ x\% - x \end{array}$$

Uczniowie otrzymywali 0 punktów za rozwiązania, w których stosowali przybliżenia ułamków zwykłych. W takich realizacjach zabrakło weryfikacji i oceny sensowności rozwiązania, tzn. liczba elementów układanki musi być liczbą naturalną. Przykład 55. ilustruje rozwiązanie z przybliżeniami ułamków zwykłych.

### Przykład 55.

$$\left. \begin{array}{l} Ela - 40\% \text{ swaich} \\ Aua - 33\% \text{ swaich} \end{array} \right\} 440$$

$$0.4x + 0.33x = 440$$

$$0.73x = 440 / : 0.73$$

Najtrudniejsze w tym obszarze było **zadanie 19.**, dwupunktowe, które dotyczyło geometrii przestrzennej. Uczniowie za jego rozwiązanie uzyskali średnio 38% punktów możliwych do zdobycia.

Wyobrażenia przestrzenne, znajomość wzoru na objętość ostrosłupa oraz jego przekształcenie, jak również sprawność rachunkowa – wszystkie te elementy miały wpływ na sukces w rozwiązywaniu tego zadania.

Maksymalną liczbę punktów za to zadanie otrzymało nieco ponad 33% zdających, którzy poprawnie zapisali wzór na objętość ostrosłupa z uwzględnieniem wszystkich danych liczbowych, poprawnie go przekształcili oraz bezbłędnie wykonali obliczenia.

Przykład 56. ilustruje rozwiązanie, w którym uczeń zapisał poprawny wzór na objętość ostrosłupa, przekształcił go, wyznaczając niewiadomą  $H$ . W kolejnym kroku podstawił dane liczbowe oraz poprawnie obliczył wysokość ostrosłupa. Następnie obliczył wysokości obu wież oraz ich różnicę.

**Przykład 56.**

$h_1$  - wysokość I wieży     $x$  - wysokość sześcianu  
 $h_2$  - wysokość II wieży     $x = 10 \text{ cm}$   
 $h_2 = 2 \cdot 10 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$   
 $a$  - krawędź podstawy ostrosłupa  
 $P_p = a^2 = (9 \text{ cm})^2 = 81 \text{ cm}^2$  - pole podstawy ostrosłupa  
 $V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H = 324 \text{ cm}^3$   
 $3V = P_p \cdot H \quad | : P_p$   
 $\frac{3V}{P_p} = H$   
 $H = \frac{3 \cdot 324 \text{ cm}^3}{81 \text{ cm}^2} = 12 \text{ cm}$   
~~.....~~  
 $h_1 = H + x = 12 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$   
 $h_2 - h_1 = 22 \text{ cm} - 20 \text{ cm} = \underline{2 \text{ cm}}$   
 ODP: Różnica wysokości obu wież wynosi 2 cm.

Przykład 57. ilustruje rozwiązanie, które pojawiało się najczęściej. Zdający podstawił wartości liczbowe do poprawnego wzoru na objętość, a następnie obliczył wysokość ostrosłupa oraz różnicę wysokości obu wież.

**Przykład 57.**

$II$  wieża =  $10 \cdot 2 = 20 \text{ cm}$   
 $I$  wieża =  $10 \text{ cm} + h = 10 \text{ cm} + 12 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$   
 $h = 12 \text{ cm}$   
 $V_0 = 324 \text{ cm}^3$   
 $V_0 = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 9 \cdot h = 27 \cdot h$   
 $324 \text{ cm}^3 = 27 \text{ cm}^2 \cdot h \quad | : 27$   
 $12 \text{ cm} = h$   
 $II \text{ wieża} - I \text{ wieża} = 20 - 22 = -2$   
 Odp. II wieża jest o 2 cm niższa od I wieży.

Przykład 58. ilustruje rozwiązanie, w którym uczeń zapisał wzór na objętość ostrosłupa, a następnie wykonał działania arytmetyczne z wykorzystaniem tego wzoru, prowadzące do wyznaczenia wysokości ostrosłupa. W ostatnim kroku obliczył różnicę wysokości obu wież.

### Przykład 58.

$$9 \times 9 = 81 \quad 81 : 3 = 27 \quad V = \frac{1}{3} P H$$


$$324 : 27 = 12$$

wieża I = 22cm      wieża II = 20cm

różnica: wieża I jest wyższa o 2cm.

W przykładach 59., 60. i 61. pokazane są rozwiązania, w których nie ma zapisanego wzoru na objętość ostrosłupa, ale z wyrażeń arytmetycznych oraz opisów wyniku, że zdający w rozwiązaniach zastosowali wzór na objętość tej bryły. W dalszej części rozwiązania poprawnie wyznaczyli różnicę wysokości wież.

### Przykład 59.



$$9^2 = 81$$

$$324 : 81 = 4 \quad \text{Kierunek} \\ \text{frakcja} \\ \text{wysokości}$$

$$4 \cdot 3 = 12 \quad \text{wysokość} \\ \text{ostrosłupa}$$

$$(10 + 12) - (10 + 10) = 2$$

I wieża      II wieża

Różnica wysokości obu wież to 2 cm

### Przykład 60.

$$10 \cdot 2 = 20 \text{ cm} \text{ wysokość II wieży}$$

$$9 \cdot 9 = 81 - P_{pr. \Delta}$$

$$324 : 3 = 972$$

$$972 : 81 = 12 \text{ cm}$$

$$12 + 10 = 22 \text{ cm} \text{ wysokość I wieży}$$

$$22 - 20 = \underline{2 \text{ cm}}$$

Odp: Wieża I jest większa od wieży II o 2 cm.

**Przykład 61.**


II wieża  
wysokość - 80 cm

I wieża  
wysokość ~~nieznana~~  $x = 22$   
 $x = 10 + 12 = 22$   
 Przekrój =  $9^2 = 81 \text{ cm}^2$   
 $81 : 3 = 27$   
 $27 \cdot 12 = 324 \text{ cm}^3$

Odpr. I wieża jest o 2 cm wyższa niż II wieża

Uczniowie w swoich rozwiązaniach wykorzystywali rysunek do oznaczenia wysokości wież (przykład 62.) lub wykonywali dodatkowo swoje szkice (przykład 63.) i na nich zaznaczali wysokości wież.

**Przykład 62.**



Oblicz różnicę wysokości obu wież. Zapisz obliczenia.

$V_{\Delta} = 324 \text{ cm}^3$        $3 \cdot 324 = 972$   
 ~~$972 : 81 = 12$~~        $972 : 81 = 12$   
 $9 \cdot 9 = 81$        $\begin{array}{r} 12 \\ 972 : 81 \\ - 81 \\ \hline 162 \\ - 162 \\ \hline 0 \end{array}$   
 $H_1 = 10 + 12 = 22 \text{ cm}$   
 $H_2 = 10 + 10 = 20 \text{ cm}$   
 $22 - 20 = 2$   
 Odp.: Różnica wysokości obu wież wynosi 2 cm.

**Przykład 63.**

$V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H$   
 $P_p = 9^2 = 81 \text{ (cm}^2\text{)}$   
 $324 = \frac{1}{3} \cdot 81 \cdot H$   
 $324 = 27 \cdot H / : 27$   
 $H = 12 \text{ (cm)}$


wysokość I wieży =  $10 + 12 = 22 \text{ (cm)}$   
 wysokość II wieży =  $10 + 10 = 20 \text{ (cm)}$   
 różnica:  $22 - 20 = 2 \text{ (cm)}$   
 Odp.: Różnica wysokości obu wież wynosi 2 cm.

Jeden punkt za rozwiązanie zadania 19. otrzymało 8% zdających. W tej grupie znalazły się realizacje, które zawierają błędy rachunkowe, niedokończone obliczenia oraz takie, które wskazują na brak umiejętności przekształcania wzorów.

Przykłady od 64. do 68. prezentują rozwiązania ocenione na 1 punkt.

Przykłady 64. i 65. ilustrują błędy rachunkowe pojawiające się w rozwiązaniach uczniowskich.

**Przykład 64.**



Oblicz różnicę wysokości obu wież. Zapisz obliczenia.

$V = \frac{1}{3} a \cdot b \cdot h$      $V = 324 \text{ cm}^3$      $324 \text{ cm}^3 : 3 = 108 : 9 = 12$

$h = 12$      $h = 12$

$12 + 10 = 24$     ~~10 + 10 = 20~~

wieża 1    wieża 2

$24 - 20 = 4 \text{ cm}$

Odp.: różnica wysokości obu wież wynosi 4 cm.

błąd rachunkowy

nieformalne zapisy



W przykładzie 67. uczeń poprawnie podstawił wartości liczbowe do wzoru na objętość ostrosłupa, ale wykonał niepoprawne przekształcenie równania, mnożąc każdy czynnik lewej strony przez 3 i nie dokończył rozwiązywania równania.

### Przykład 67.

$$\frac{1}{3} \cdot 824 \cdot H = 824 \cdot 3$$

$$\frac{1}{3} \cdot 824 \cdot 9 = 824 \cdot 3$$

$$1 \cdot 2472 \cdot 1 = 2472$$

$$2472 / 9 = 274$$

$$429H = 9141 : 429$$

$$H =$$

Przykład 68. to rozwiązanie, w którym uczeń prawidłowo obliczył wysokości obu wież, ale nie obliczył różnicy tych wysokości.

### Przykład 68.

~~Przykład~~

Pole podstawy sześcianu =  $100 \text{ cm}^2$

Pole podstawy ostrosłupa =  $81 \text{ cm}^2$

$$V_0 = \frac{1}{3} \cdot 81 \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 81 \cdot h = 12$$

$$324 = 27 \cdot h$$

I wieża  
 $h = 20$

II wieża  
 $h = 22$

Nieznacznie ponad 58% zdających otrzymało za rozwiązanie zadania 0 punktów. Oprócz tych, którzy w ogóle nie podjęli próby rozwiązania zadania, są osoby, które w swoich rozwiązaniach do poprawnego wzoru na objętość ostrosłupa wstawiły błędne dane liczbowe (przykłady 69. i 70.). W przykładzie 69. uczeń we wzorze na objętość ostrosłupa użył wartość długości krawędzi sześcianu, a rozwiązujący przykład 70. za pole podstawy podstawił długość krawędzi podstawy.



## Przykład 69.

$$h_2(11 \text{ wieży}) = 2 \cdot 10 = 20 \text{ cm}$$

$$h_1(1 \text{ wieży}) = 10 + h_2 = x$$

rozwiązanie

$$\frac{1}{3} \cdot 10^2 \cdot h_2 = 324 \text{ cm}^3 / : 3$$

$$10^2 \cdot h_2 = 972 \text{ cm}^3$$

$$100 \cdot h_2 = 972 \text{ cm}^3 / : 100$$

$$h_2 = 9,72 \text{ cm}$$

$$h_2 \approx 20 \text{ cm}$$

$$h_1 = 10 + 9,72 = 19,72 \text{ cm}$$

$$\text{różnica} = 20 - 19,72 = 0,28 \text{ cm}$$

błędnie wstawiona dana liczbową

## Przykład 70.

$$H \text{ obu sześciątów} = 10 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

$$V_d = \frac{1}{3} P_p \cdot H$$

$$\frac{1}{3} \cdot 9 \cdot H = 324 \text{ cm}^3$$

$$3 \cdot H = 324 \text{ cm}^3 / : 3$$

$$H = 108 \text{ cm}$$

wysokość pierwszej wieży:

$$10 \text{ cm} + 108 \text{ cm} = 118 \text{ cm}$$

wysokość drugiej wieży:

$$10 \text{ cm} + 10 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

~~różnica~~ różnica obu wież różnica wysokości obu wież

$$118 \text{ cm} - 20 \text{ cm} = 98 \text{ cm}$$

Odp: Różnica wysokości obu wież wynosi 98 cm.

brak poprawnego zastosowania wzoru na pole podstawy ostrosłupa  $P_p$

W przykładach 71. i 72. pokazano rozwiązania, w których zdający zastosowali niepoprawne wzory na objętość ostrosłupa, co skutkowało uzyskaniem za rozwiązanie zadania 0 punktów.

**Przykład 71.**

$V = 324 \text{ cm}^3$   
 $V = \frac{Pr \cdot H}{2}$  błędny wzór  
 $4 \cdot 324 = \frac{81 \cdot H}{2} \cdot 2$   
 $648 = 81 \cdot H \cdot 1$   
 $\frac{648}{81} = H$   
 $\frac{648}{81} = 81$   
 $\frac{648}{81} = 8$   
 $H = 8 \text{ cm}$   
 $H = 8 + 10 = 18 \text{ m}$   
 $H = 18 \text{ cm}$


$H = 10 \text{ cm}$   
 $H = 10 \cdot 2 = 20 \text{ cm}$   
 $H_2 = 20 \text{ cm}$   
~~20 cm - 18 cm = 2 cm~~  
 Odp. Różnica wysokości obu wież jest równa 2 cm.

**Przykład 72.**

$a = 10 \text{ cm}$   
 $20 \text{ cm} \rightarrow$  wysokość wieży II  
 $P_{\text{ostro}} \rightarrow 9 \text{ cm} \cdot 9 \text{ cm} = 81 \text{ cm}^2$   
 $V_{\text{ostro}} = 324 \text{ cm}^3$  błędny wzór  $V_{\text{ostro}} = P_p \cdot H$   
 $\text{Ostrosłup} \rightarrow \text{Ostro}$   $324 \text{ cm}^3 = 81 \text{ cm}^2 \cdot H \quad | : 81 \text{ cm}^2$   
 $4 \text{ cm} = H$   
 $10 \text{ cm} + 4 \text{ cm} \rightarrow$  wysokość wieży I  
~~$\frac{324}{81} = 324$   
 $\frac{324}{81} = 4$~~  
 $20 \text{ cm} - 14 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$   
 Odp. Różnica wysokości obu wież to 6 cm.

Czwarte wymaganie ogólne, czyli **rozumowanie i argumentacja**, sprawdzane było trzema zadaniami, w tym dwoma zamkniętymi (zadania 13. i 14.) oraz jednym otwartym (zadanie 17.). Zdający uzyskali za ich rozwiązanie średnio 53% punktów możliwych do zdobycia.

Najłatwiejsze w tym obszarze było **zadanie 13.**, z którym bezbłędnie poradziło sobie 71% zdających. Rozwiązując zadanie, należało, na podstawie zaprezentowanego na rysunku podziału prostokąta na kwadraty, sformułować wniosek dotyczący stosunku długości boków tego prostokąta. Uczniowie w poszukiwaniu poprawnej odpowiedzi wspomagali się rysunkiem z zadania (przykład 73.) lub samodzielnie rysowali w brudnopisie swoją interpretację treści zadania (przykład 74.).




Najtrudniejszym w tym obszarze okazało się zamknięte **zadanie 14.**, które wymagało od zdającego tworzenia i stosowania strategii wynikającej z treści zadania, prowadzącej do rozwiązania problemu. Z poprawnym rozwiązaniem zadania poradziło sobie tylko 36% zdających. Prawdziwość pierwszego zdania poprawnie określiło 51% ósmoklasistów. W celu obliczenia długości przyprostokątnej trójkąta prostokątnego równoramiennego należało zastosować wzór na jego pole. W celu oceny drugiego zdania niezbędne było obliczenie pola mniejszego trójkąta prostokątnego przedstawionego na rysunku. Z tą częścią zadania poradziło sobie 56% ósmoklasistów.

Podobnie jak w poprzednim zadaniu uczniowie wspomagali się rysunkiem zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym lub samodzielnie rysowali interpretację zadania w brudnopisie.

Przykłady 75. i 76. ilustrują poprawne rozwiązania uczniowskie.

**Przykład 75.**



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Przyprostokątna trójkąta $ADE$ jest równa 20 cm.	<input checked="" type="radio"/> P	<input type="radio"/> F
Pole trójkąta $ABC$ jest równe $52 \text{ cm}^2$ .	<input checked="" type="radio"/> P	<input type="radio"/> F

Handwritten student work on grid paper:

$$P_{ADE} = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{20 \cdot 20}{2} = 200 \text{ cm}^2$$

$$a \cdot h = 400 \text{ cm}^2$$

$$\frac{20 \cdot 20}{2} = 200 \text{ cm}^2$$

$$\frac{8 \cdot 13}{2} = 52 \text{ cm}^2$$

**Przykład 76.**

Handwritten student work on grid paper:

$P_{ADE} = 200 \text{ cm}^2$        $20 \cdot 20 = 400$

$AD = AE$

$AD, AE = x \text{ cm}$

$P_{ADE} = \frac{1}{2} x^2 = 200$        $/:2$

$x^2 = 400$        $\sqrt{400} = 20$

$x = 20$

$20 - 12 = 8$

$20 - 7 = 13$

$P_{ABC} = \frac{1}{2} 8 \cdot 13 = 4 \cdot 13$

$$\begin{array}{r} 4 \cdot 13 \\ = 52 \\ \hline 52 \end{array}$$

W rozwiązaniu **zadania 17**, konieczne było zaplanowanie kolejnych kroków prowadzących do obliczenia pola trapezu. Było to zadanie trzypunktowe, w którym należało skorzystać z własności trójkąta równoramiennego, zastosować twierdzenie Pitagorasa oraz znaleźć sposób obliczenia pola trapezu.

Bez błędnie z zadaniem poradziło sobie prawie 40% tegorocznych ósmoklasistów. Przedstawili oni w pełni poprawne rozwiązanie tego zadania i otrzymali maksymalną możliwą liczbę punktów (przykłady od 77. do 81.).

Uczniowie najczęściej zaczynali rozwiązanie od obliczenia długość odcinka  $AE$ , korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Następnie, korzystając z własności trójkąta równoramiennego  $ACE$ , ustalali, że długość odcinka  $EC$  jest równa długości odcinka  $AE$ . W kolejnym kroku obliczali długość odcinka  $AB$ , korzystając z zależności między długością tego odcinka a długością odcinków  $DE$  i  $EC$ . Ostatnim etapem było obliczenie pola trapezu.

Poprawne rozwiązanie ilustruje przykład 77.

**Przykład 77.**

$P_{\triangle ABCE} = ?$

$|AE| = 25 \text{ cm}$ , bo  $\triangle AED$  to  $\triangle$  PITAGOREJSKI  
 więc  $|CE| = 25 \text{ cm}$ , bo  $\triangle AEC$  to  $\triangle$  RÓWNOBIAŚNIENNY


$|AB| = 25 + 15 = 40 \text{ cm}$

$P_{\triangle ABCE} = \frac{(40+25) \cdot 20}{2}$

$P_{\triangle ABCE} = \underline{\underline{650 \text{ cm}^2}}$       odp.: Pole trapezu  $ABCE$  wynosi  $650 \text{ cm}^2$ .

Przykład 78. ilustruje w pełni poprawne rozwiązanie tego zadania. Zdający oblicza długość odcinka  $AE$ , korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Na rysunku przy odcinkach  $AE$  i  $EC$  zapisuje  $x$ , co wskazuje na skorzystanie z własności trójkąta równoramiennego. W ostatnim kroku oblicza pole trapezu.

**Przykład 78.**



Oblicz pole trapezu  $ABCE$ . Zapisz obliczenia.

$20^2 + 15^2 = x^2$   
 $400 + 225 = x^2$   
 $625 = x^2$   
 $\sqrt{625} = x$   
 $25 = x$

$\begin{array}{r} 15 \\ -15 \\ \hline 225 \end{array}$

$\begin{array}{r} 625 \overline{) 925} \\ \underline{625} \phantom{0} \\ 300 \phantom{0} \\ \underline{300} \phantom{0} \\ 0 \phantom{0} \end{array}$

$P = \frac{(a+b) \cdot h}{2} = \frac{(40+25) \cdot 20}{2} = \frac{65 \cdot 20}{2} = 65 \cdot 10 = 650 \text{ cm}^2$

Odp: Pole trapezu  $ABCE$  jest równe  $650 \text{ cm}^2$

Rozwiązanie, w którym uczeń przedstawił sposób obliczenia pola trapezu jako różnicę pola prostokąta  $ABCD$  i pola trójkąta  $AED$ , ilustruje przykład 79.

**Przykład 79.**

Al - przekątna prostokąta ABCD

$$P_{ABCE} = P_{ABCD} - P_{ADE}$$

$$P_{ADE} = \frac{20 \cdot 15}{2} = 150 \text{ cm}^2$$

$$P_{ABCD} = DC \cdot AD$$

$$AE^2 = 20^2 + 15^2$$

$$AE^2 = 400 + 225$$

$$AE^2 = 625$$

$$AE = \sqrt{625}$$

$$AE = 25 \text{ cm}$$

$$CE = 25 \text{ cm}$$

$$DC = DE + CE$$

$$DC = 15 \text{ cm} + 25 \text{ cm}$$

$$DC = 40 \text{ cm}$$

$$P_{ABCD} = 40 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm}$$

$$P_{ABCD} = 800 \text{ cm}^2$$

$$P_{ABCE} = 800 \text{ cm}^2 - 150 \text{ cm}^2 = 650 \text{ cm}^2$$

$\begin{array}{r} 4 \\ 25 \\ \hline 125 \\ 125 \\ \hline 250 \\ 625 \end{array}$

$\begin{array}{r} 20^2 + 15^2 = x^2 \\ 400 + 225 = x^2 \\ 625 = x^2 \\ \sqrt{\quad} \\ 25 = x \\ \text{cm} \end{array}$

$\begin{array}{r} P_{\square} = 25 \cdot 20 \\ P_{\square} = 500 \\ \text{cm}^2 \end{array}$

$\begin{array}{r} P_{\triangle} = \frac{15 \cdot 20}{2} \\ P_{\triangle} = \frac{300}{2} \\ P_{\triangle} = 150 \text{ cm}^2 \end{array}$

$P_{ABCE} = P_{\square} + P_{\triangle} = 500 + 150 = 650 \text{ cm}^2$

Odpowiedź: Pole trapezu ABCE wynosi  $650 \text{ cm}^2$ .

Przykład 80. to rozwiązanie, w którym uczeń obliczył pole trapezu jako sumę pola trójkąta przystającego do trójkąta  $AED$  i pola prostokąta o bokach  $CE$  i  $BC$ .

**Przykład 80.**

$\begin{array}{r} 15 \cdot 15 = \\ 15 \cdot 15 + 5 \cdot 15 \\ 225 + 75 \\ \hline 300 \\ 300 : 2 = 150 \end{array}$

$\begin{array}{r} 20^2 + 15^2 = x^2 \\ 400 + 225 = x^2 \\ 625 = x^2 \\ \sqrt{\quad} \\ 25 = x \\ \text{cm} \end{array}$

$\begin{array}{r} P_{\square} = 25 \cdot 20 \\ P_{\square} = 500 \\ \text{cm}^2 \end{array}$

$\begin{array}{r} P_{\triangle} = \frac{15 \cdot 20}{2} \\ P_{\triangle} = \frac{300}{2} \\ P_{\triangle} = 150 \text{ cm}^2 \end{array}$


$P_{ABCE} = P_{\square} + P_{\triangle} = 500 + 150 = 650 \text{ cm}^2$

odp:  $P_{ABCE}$  jest równe  $650 \text{ cm}^2$



Przykład 82. ilustruje poprawne rozwiązanie pod względem zastosowanych metod, jednak zawierające błąd rachunkowy.

**Przykład 82.**



Oblicz pole trapezu ABCE. Zapisz obliczenia.

Obliczam odcinek c

$$15^2 + 20^2 = c^2$$

$$225 + 400 = c^2$$

$$625 = c^2 \quad | \sqrt{\quad}$$

$$\sqrt{625} = c$$

$$25 = c$$

Obliczam odcinek EC

Odcinek EC ma taką samą długość jak odcinek c ponieważ jest to trójkąt równoboczny.

$$EC = c = 25 \text{ cm}$$

Obliczam odcinek AB

$$AB = 15 \text{ cm} + 25 \text{ cm} = 40 \text{ cm}$$

Obliczam odcinek CB

Odcinek CB ma długość 20 cm ponieważ jest równoległy do odcinka DA

$$CB = DA = 20 \text{ cm}$$

Obliczam pole trapezu ABCB

$$h \cdot (a + b) \cdot \frac{1}{2}$$

$$CB \cdot (EC + AB) \cdot \frac{1}{2}$$

$$20 \cdot (25 + 40) \cdot \frac{1}{2}$$

$$20 \cdot (65) \cdot \frac{1}{2}$$

$$1450 \cdot \frac{1}{2}$$

$$725 \text{ m}^2$$

Obliczenia rachunkowe:

$$\begin{array}{r} 65 \\ \cdot 20 \\ \hline 1450 \\ 1450 : 2 \\ \hline 725 \end{array}$$

błąd rachunkowy

Obliczenia rachunkowe z błędami:


$$\begin{array}{r} 65 \\ \cdot 20 \\ \hline 00 \\ 145 \\ \hline 1450 \\ 725 \\ \hline 1450 : 2 \\ \hline -14 \\ \hline = \\ -4 \\ \hline = 1 \\ -10 \\ \hline = \end{array}$$

Odp: Pole trapezu ABCE wynosi  $725 \text{ m}^2$



W przykładzie 83. uczeń zastosował poprawne metody, jednak wynik podał bez jednostki, a w przykładzie 84. zapisał błędną jednostkę pola.

**Przykład 83.**



Oblicz pole trapezu ABCE. Zapisz obliczenia.

$P_{\triangle AED} = \frac{15 \cdot 20}{2} = 150 \text{ cm}^2$       $P_{\Delta} = \frac{(a+b) \cdot h}{2} = \frac{(a+b) \cdot 20}{2} = (a+b) \cdot 10$


$|AE|^2 = 20^2 + 15^2$   
 $|AE|^2 = 400 + 225$   
 $|AE|^2 = 625$   
 $|AE| = \sqrt{625} = 25$

$P_{\Delta} = (25 + 40) \cdot 10 = 650$

Odp. Pole trapezu ABCE wynosi 650.

brak jednostki pola

**Przykład 84.**



Oblicz pole trapezu ABCE. Zapisz obliczenia.

$20^2 + 15^2 = x^2$   
 $400 + 225 = x^2$   
 $x^2 = 625$   
 $x = \sqrt{625}$   
 $x = 25$

$P = \frac{(a+b) \cdot h}{2} = \frac{(40+25) \cdot 20}{2} =$   
 $= \frac{65 \cdot 20}{2} = 650 \text{ cm}$

Odp. Pole trapezu wynosi 650 cm.

błędna jednostka pola



Przykłady od 86. do 88. ilustrują rozwiązania tego zadania ocenione na 1 punkt.

W przykładzie 86. zdający podczas stosowania twierdzenia Pitagorasa popełnił błąd rachunkowy i na tym zakończył rozwiązanie zadania.

**Przykład 86.**

$$15^2 + 20^2 = x^2$$

$$225 + 400 = x^2$$

$$525 = x^2$$


$$\sqrt{525} = x$$

poprawne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa z błędem rachunkowym

Przykład 87. to rozwiązanie, w którym zdający podczas stosowania twierdzenia Pitagorasa popełnił błąd rachunkowy oraz wykorzystał równoramiennność trójkąta ACE. Jednak nie uwzględnił zależności między długościami podstaw trapezu oraz nie zastosował wzoru na pole trapezu.


**Przykład 87.**

trapez prostokątny



$$P_D = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$$

poprawne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa



$$20^2 + 15^2 = x^2$$


błąd rachunkowy

$$400 + 235 = x^2$$

$$\sqrt{635} = x$$

trójkąt Pitagorejski (Prostokątny)

trójkąt Równoramienny



równość odcinków AE i CE wynikająca z własności trójkąta równoramiennego

Handwritten calculations on the right side of the page:

$$\begin{array}{r} 256 \\ 214 \\ \hline 284 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ 20 \\ \hline 400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 235 \\ 235 \\ \hline 75 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 75 \\ 75 \\ \hline 150 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 17 \\ 17 \\ \hline 34 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 139 \\ 139 \\ \hline 278 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 309 \end{array}$$

Przykład 88. to rozwiązanie, w którym zapisany sposób obliczenia pola trapezu wskazuje na brak uwzględnienia zależności między długościami podstaw trapezu.

**Przykład 88.**



wykorzystanie własności trójkąta równoramiennego

Oblicz pole trapezu ABCE. Zapisz obliczenia.

$15^2 + 20^2 = x^2$   
 $225 + 400 = x^2$   
 $625 = x^2 / \sqrt{\quad}$   
 $x = \sqrt{625} = 5\sqrt{5} = 25$   
 $P = \frac{(a+b)h}{2} = \frac{(25+25) \cdot 20}{2} = 500 \text{ m}^2$   
 op. Pole trapezium ABCE wynosi  $500 \text{ m}^2$

$$\begin{array}{r} 20 \cdot 25 \\ \hline 400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ \cdot 15 \\ \hline 300 \\ + 200 \\ \hline 500 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ \cdot 25 \\ \hline 125 \\ + 500 \\ \hline 625 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 625 \\ \cdot 18 \\ \hline 11250 \\ + 12500 \\ \hline 32250 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 625 \\ \cdot 18 \\ \hline 11250 \\ + 12500 \\ \hline 32250 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 625 \\ \cdot 18 \\ \hline 11250 \\ + 12500 \\ \hline 32250 \end{array}$$

błędny wzór na pole trapezu ABCE

Ponad 31% tegorocznych ósmoklasistów uzyskało za rozwiązanie tego zadania 0 punktów. Oprócz tych, którzy w ogóle nie podjęli próby rozwiązania zadania byli uczniowie, którzy w swoich rozwiązaniach stosowali błędne metody albo realizowali zupełnie inne polecenia.

Przykład 89. ilustruje rozwiązanie ocenione na 0 punktów. W rozwiązaniu zamieszczonym w tym przykładzie pojawia się liczba 40 – długość boku AB bez zapisanego sposobu jej wyznaczenia. Ponadto uczeń zamiast obliczyć pole trapezu – obliczył obwód prostokąta i zastosował jednostkę pola.

**Przykład 89.**

$20 \text{ cm} + 20 + 15 + 25 = 40 = 40 + 40 + 40 = 120 \text{ m}^2$

## Wnioski i rekomendacje

Łatwość tegorocznego arkusza zastosowanego na egzaminie ósmoklasisty z matematyki wynosi 57%. Poziom wykonania poszczególnych zadań jest zróżnicowany. Dla zadań zamkniętych przyjmuje wartości od 36% do 75%, a dla zadań otwartych od 38% do 58%. Zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024.

Były wśród nich: działania na liczbach naturalnych, działania na ułamkach, potęgach, obliczenia procentowe, stosowanie podziału proporcjonalnego, obliczanie średniej arytmetycznej, przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sprawdzano również zagadnienia z zakresu geometrii płaskiej, przestrzennej oraz zagadnienia dotyczące prawdopodobieństwa.

Najłatwiejsze dla uczniów okazały się zadania zamknięte, w których treść sformułowana była w typowy sposób, a problem do rozwiązania nie wymagał wykorzystania umiejętności złożonych (np. zadania 1., 5., 9., 10., 11., 12., 13.).

Największą grupę zadań stanowiły te, które sprawdzały umiejętności z zakresu wykorzystania i tworzenia informacji. Często zadania były osadzone w kontekście praktycznym lub treść wzbogacona była rysunkiem, co ułatwiało zdającym ich rozwiązanie.

Najtrudniejsze do rozwiązania dla ósmoklasistów okazały się zadania wieloetapowe, które wymagały łączenia wiedzy i umiejętności z różnych działów matematyki (zadania 6., 14., 16., 17., 19.). Zadanie 14. z geometrii płaskiej, które sprawdzało umiejętności z zakresu *rozumowania i argumentacji* było najtrudniejsze w całym arkuszu. Sprawdzało ono znajomość i umiejętność przekształcania wzoru na pole trójkąta.

Równie trudne dla zdających było zadanie 19. - z geometrii przestrzennej sprawdzające umiejętności z zakresu *wykorzystania i tworzenia reprezentacji*, które wymagało znajomości i umiejętności stosowania oraz przekształcania wzoru na objętość ostrosłupa. Uczniowie mieli problem z interpretacją danych i poprawną ich identyfikacją we wzorze.

Oba zadania (14. i 19.) wymagały umiejętności tworzenia i przekształcania wyrażeń algebraicznych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczniowie nie radzą sobie z tworzeniem wyrażeń algebraicznych na podstawie danych i informacji zawartych w treści zadania oraz z przekształcaniem wyrażeń algebraicznych. Z analizy rozwiązań uczniowskich wynika, że zdający mają trudności z zapisaniem poprawnego równania wynikającego z treści zadania (zadania 16. i 19.). Problemy pojawiają się również podczas wykonywania działań na wyrażeniach algebraicznych (zadanie 9.) oraz podczas ich przekształcania.

Uczniowie słabo radzą sobie z przekształcaniem wzorów oraz rozwiązywaniem prostych równań (zadania 6., 16., 19.).

Dużym problemem dla uczniów jest także brak sprawności rachunkowej, która jest niezbędna do otrzymywania poprawnych wyników. Uczniowie popełniali błędy rachunkowe na różnych etapach rozwiązania zadania. Wśród piszących byli tacy, którzy popełnili błąd rachunkowy na pierwszym etapie rozwiązania i nie potrafili już kontynuować rozwiązania, ale również tacy, którym błąd popełniony na pierwszym etapie rozwiązania znacznie utrudnił doprowadzenie rozwiązania zadania do końca.

Uczniowie nie radzili sobie również z zastosowaniem poprawnej jednostki w zadaniach z zakresu geometrii.

Zagadnienia, których rozwiązanie sprowadzało się do operowania wyrażeniami arytmetycznymi, były łatwiejsze od tych, które wymagały tworzenia i przekształcania wyrażeń algebraicznych. Ósmoklasiści często, nawet w typowych zadaniach algebraicznych, wybierali arytmetyczne sposoby rozwiązania zadania, stosowali nieformalne zapisy i w ten sposób dążyli do rozwiązania problemu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczniowie podejmują próby rozwiązania, stosując różne, nieszablonowe metody rozwiązywania problemów.

Ósmoklasiści często nie radzą sobie z rozwiązaniem zadania otwartego, w szczególności nie potrafią zaplanować i poprawnie wykonać ciągu czynności prowadzących do rozwiązania problemu. Szczególnie widać to w zadaniu 18., gdzie do rozwiązania zadania uczeń musiał wykonać szereg obliczeń, a także prawidłowo odczytać informacje zawarte w tabeli będącej integralną częścią zadania.

Zdarzały się błędy wynikające z zastosowania niepoprawnych metod, niedokładnej analizy treści zadania czy też nieuważnego czytania polecenia. W zadaniach zamkniętych uczniowie często nie wracali do pytania postawionego w treści, lecz wskazywali odpowiedź pasującą do pośredniego wyniku otrzymanego w trakcie obliczeń.

Wnioski, które wynikają z analiz jakościowych i ilościowych wyników tegorocznego egzaminu, mogą być pomocne w planowaniu pracy dydaktycznej na kolejny rok. W praktyce szkolnej, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, warto uwzględnić niżej wymienione aktywności.

1. Ćwiczyć i doskonalić sprawność i umiejętności rachunkowe niezbędne do poprawnego rozwiązywania zadań.
2. Dokonywać szczegółowej analizy zadań oraz dzielenia rozwiązań zadań tekstowych na etapy.
3. Zwracać uwagę na dokładną analizę form graficznych zamieszczonych w zadaniach, jak również zachęcać uczniów do wykonywania pomocniczych rysunków, schematów oraz wyróżniania istotnych informacji zawartych w treści zadania.
4. Ćwiczyć umiejętność wprowadzania i stosowania oznaczeń literowych oraz zapisywania wyrażeń algebraicznych na podstawie informacji zawartych w zadaniu.
5. Ćwiczyć umiejętność dostrzegania zależności między informacjami podanymi w zadaniu i zapisywania ich za pomocą równań z jedną niewiadomą.
6. Doskonalić umiejętność rozwiązywania równań, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
7. Ćwiczyć umiejętność przekształcania prostych wzorów, aby wyznaczyć zadaną wielkość, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wzory geometryczne (np. wzory na pola i obwody figur oraz objętości brył).
8. Stwarzać uczniom możliwość rozwiązywania zadań łączących wiedzę z różnych działów matematyki w celu jednoczesnego utrwalenia poznanych już wcześniej zagadnień oraz kształcenia nowych umiejętności. W proponowanych uczniom zadaniach wykorzystywać sytuacje z życia codziennego.
9. Ćwiczyć umiejętności budowania modelu matematycznego dla danego kontekstu, w szczególności na przykładach zadań, które można rozwiązać różnymi sposobami.

10. Ćwiczyć umiejętność rozpoznawania oraz budowania figur geometrycznych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w treści zadania ze zwróceniem szczególnej uwagi na bryły.
11. Zwracać uwagę na potrzebę dokonywania refleksji i oceny sensowności otrzymanego wyniku w odniesieniu do rzeczywistości, wyrabiać nawyk sprawdzania otrzymanego wyniku z warunkami zadania.

## Podstawowe informacje o arkuszach dostosowanych

### Opis arkusza dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z zakresu matematyki (OMAP-200-2405) został przygotowany na podstawie arkusza standardowego OMAP-100-2405, zgodnie z zaleceniami specjalistów. Uczniowie otrzymali arkusze dostosowane pod względem graficznym: wyróżniono informację o numerze każdego zadania i liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie, zwiększono odstępy między wierszami w tekstach, zastosowano – jednolity w całym arkuszu – pionowy układ odpowiedzi. W zadaniach zamkniętych umieszczono informacje o sposobie zaznaczenia właściwych odpowiedzi oraz dodano miejsca na rozwiązanie zadań – brudnopis. W zadaniach otwartych uszczegółowiono polecenia i wskazano miejsca na zapisanie odpowiedzi.

### Wyniki uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

WYKRES 5. ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW




TABELA 12. WYNIKI UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
1 534	0	100	56	96	55	29



## Opis arkusza dla uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych

Arkusze dla uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych z zakresu matematyki (OMAP-400-2405, OMAP-500-2405, OMAP-600-2405) zostały przygotowane na podstawie arkusza OMAP-100-2405, zgodnie z zaleceniami specjalistów pracujących z uczniami z dysfunkcją wzroku. Uczniowie słabowidzący otrzymali arkusze, w których dostosowano wielkość czcionki (odpowiednio Arial 16 pkt i Arial 24 pkt), odstępy między wierszami, zmodyfikowano słownictwo i polecenia w zadaniach, uproszczono i powiększono formy graficzne, zastosowano – jednolity w całym arkuszu – pionowy układ odpowiedzi. Dla uczniów niewidomych przygotowano arkusz w brajlu.

### Wyniki uczniów słabowidzących i uczniów niewidomych

WYKRES 6. ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW




TABELA 13. WYNIKI UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH I UCZNIÓW NIEWIDOMYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
88	0	100	30	24	39	28

## Opis arkusza dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących

Uczniowie słabosłyszący i uczniowie niesłyszący rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OMAP-700-2405, który został przygotowany na podstawie arkusza OMAP-100-2405 i dostosowany do ich dysfunkcji przez specjalistów. Trzono zadań i polecenia uproszczono, ograniczając je do niezbędnych informacji oraz dostosowano słownictwo. Wyróżniono podkreśleniem istotne do rozwiązania zadań informacje, uszczegółowiono opis rysunków.

### Wyniki uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących

WYKRES 7. ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW




TABELA 14. WYNIKI UCZNIÓW SŁABOSŁYSZĄCYCH I UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
124	4	100	48	16	53	31

## Opis arkusza dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OMAP-800-2405. Arkusz egzaminacyjny zawierał 15 zadań: 10 zamkniętych i 5 otwartych. Wśród zadań zamkniętych były zadania wyboru wielokrotnego i zadania typu prawda-falsz. Zadania otwarte wymagały od uczniów samodzielnego sformułowania rozwiązania i zapisania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów (15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte). Treści zadań przedstawiono lub dodatkowo zilustrowano za pomocą różnych form graficznych – tabele, rysunki – które ułatwiały udzielenie poprawnych odpowiedzi. Wiele z nich nawiązywało do sytuacji życiowych bliskich uczniowi.

### Wyniki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

WYKRES 8. ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW




TABELA 15. WYNIKI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
741	8	96	36	28	39	16

## Opis arkusza dla uczniów z afazją

Uczniowie z afazją rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OMAP-900-2405. Arkusz egzaminacyjny zawierał 17 zadań: 12 zamkniętych i 5 otwartych. Wśród zadań zamkniętych było 9 zadań wyboru wielokrotnego i 3 zadania typu prawda-falsz. Zadania otwarte wymagały od uczniów samodzielnego sformułowania rozwiązania oraz zapisania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów (15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte). Arkusz został dostosowany zgodnie z zaleceniami specjalistów. Uczniowie otrzymali arkusze dostosowane pod względem graficznym: zastosowano czcionkę Arial 14 pkt, każde zadanie umieszczono na osobnej stronie, wyróżniono informację o numerze zadania i liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie, zwiększono odstępy między wierszami w tekstach i powiększono rysunki, zastosowano – jednolity w całym arkuszu – pionowy układ odpowiedzi. Przy każdym zadaniu zamkniętym umieszczono informację o sposobie zaznaczenia właściwej odpowiedzi.

### Wyniki uczniów z afazją

WYKRES 9. ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW




TABELA 16. WYNIKI UCZNIÓW Z AFAZJĄ – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
142	8	100	40	24	46	25

## Opis arkusza dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OMAP-Q00-2405. Arkusz egzaminacyjny zawierał 17 zadań: 12 zamkniętych i 5 otwartych. Wśród zadań zamkniętych było 9 zadań wyboru wielokrotnego i 3 typu prawda-falsz. Zadania otwarte wymagały od uczniów samodzielnego sformułowania rozwiązania oraz zapisania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów (15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte). Arkusz został dostosowany zgodnie z zaleceniami specjalistów. Uczniowie otrzymali arkusze dostosowane pod względem graficznym: zastosowano czcionkę Arial 14 pkt, każde zadanie umieszczono na osobnej stronie, wyróżniono informację o numerze zadania i liczbie punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie, zwiększono odstępy między wierszami w tekstach i powiększono rysunki, zastosowano – jednolity w całym arkuszu – pionowy układ odpowiedzi. Przy każdym zadaniu zamkniętym umieszczono informację o sposobie zaznaczenia właściwej odpowiedzi.

### Wyniki uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

WYKRES 10. ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW




TABELA 17. WYNIKI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ SPOWODOWANĄ MÓZGOWYM PORAZENIEM DZIECIĘCYM – PARAMETRY STATYSTYCZNE


Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
22	8	100	48	92	55	31

## Opis arkusza dla uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy (cudzoziemcy)

Uczniowie, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy (cudzoziemcy), rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OMAP-C00-2405. Arkusz ten składał się z 19 zadań: 15 zamkniętych oraz 4 otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów (15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte). Arkusz był dostosowany do potrzeb zdających, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

### Wyniki uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy (cudzoziemcy)

**WYKRES 11.** ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW



**TABELA 18.** WYNIKI UCZNIÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.94A UST.1 USTAWY (CUDZOZIEMCY) – PARAMETRY STATYSTYCZNE


Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
1 353	0	100	52	100	55	29

## Opis arkusza dla uczniów obywateli Ukrainy

Uczniowie, obywatele Ukrainy rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu OMAU-C00-2405, przetłumaczone w arkuszu standardowym z języka polskiego na język ukraiński.

### Wyniki uczniów obywateli Ukrainy

**WYKRES 12.** ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW



**TABELA 19.** WYNIKI UCZNIÓW OBYWATELI UKRAINY – PARAMETRY STATYSTYCZNE


Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
2 041	0	100	32	20	40	25

## Opis arkusza dla uczniów z zaburzeniem widzenia barw

Arkusz dla uczniów z zaburzeniem widzenia barw z zakresu matematyki (OMAP-K00-2405) został przygotowany na podstawie arkusza standardowego OMAP-100-2405. Zgodnie z zaleceniami specjalistów wszystkie rysunki, ilustracje i elementy graficzne zostały wykonane w odcieniach szarości.

### Wyniki uczniów z zaburzeniem widzenia barw

**WYKRES 13.** ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW



**TABELA 21.** WYNIKI UCZNIÓW Z ZABURZENIEM WIDZENIA BARW – PARAMETRY STATYSTYCZNE

Liczba uczniów	Minimum (%)	Maksimum (%)	Mediana (%)	Modalna (%)	Średnia (%)	Odchylenie standardowe (%)
11	24	96	80	96	69	28



**CK**  
**CENTRALNA  
KOMISJA  
EGZAMINACYJNA**



**OKE**

**OKE**  
OKRĘGOWA  
KOMISJA  
EGZAMINACYJNA  
W KRAKOWIE

**OKE**  
Łomża

**OKE**  
Ł O D Ź

**OKE**  
OKRĘGOWA KOMISJA  
EGZAMINACYJNA W POZNANIU

**OKE**

**OKE**  
we Wrocławiu

### Centralna Komisja Egzaminacyjna

ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa  
tel. 22 536-65-00, fax 22 536-65-04  
www.cke.gov.pl sekretariat@cke.gov.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk  
tel. 58 320-55-90, fax 58 320-55-91  
www.oke.gda.pl komisja@oke.gda.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno  
tel. 32 784-16-00, fax 32 784-16-08  
www.oke.jaworzno.pl sekretariat@oke.jaworzno.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

os. Szkolne 37, 31-978 Kraków  
tel. 12 683-21-01, fax 12 683-21-00  
www.oke.krakow.pl oke@oke.krakow.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Al. Legionów 9, 18-400 Łomża  
tel. 86 473-71-20, fax 86 473-68-17  
www.oke.lomza.pl sekretariat@oke.lomza.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź  
tel. 42 664-80-50, fax 42 634-91-54  
www.oke.lodz.pl sekretariat@lodz.oke.gov.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań  
tel. 61 854-01-60, fax 61 852-14-41  
www.oke.poznan.pl sekretariat@oke.poznan.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa  
tel. 22 457-03-35, fax 22 457-03-45  
www.oke.waw.pl info@oke.waw.pl

### Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

ul. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław  
tel. 71 785-18-94, fax 71 785-18-66  
www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl